UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE ICA

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA ACADÉMICO DE OBSTETRICIA**

TESIS

**“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL DESGARRO
PERINEAL EN PUERPERAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE
GINECO – OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III – ESSALUD,
JULIACA 2024.”**

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

**SALUD PÚBLICA, SALUD AMBIENTAL Y SATISFACCIÓN CON LOS
SERVICIOS DE SALUD**

PRESENTADO POR:

**LAURA FIORELLA CORNEJO GADEA
CÓDIGO ORCID N° 0009-0003-7392-9072
DAYERLI KAORI MAMANI GONZALES
CÓDIGO ORCID N° 0009-0000-2389-7031**

**TESIS DESARROLLADA PARA OPTAR EL TÍTULO
PROFESIONAL DE OBSTETRA**

DOCENTE ASESOR:

**MG. RAFAEL REGINALDO HUAMANI
CÓDIGO ORCID N° 0000-0002-8326-4276**

CHINCHA, 2025

CONSTANCIA DE APROBACIÓN

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE ICA

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE INVESTIGACIÓN

Chincha, 25 de marzo del 2025

Mg. Jose Yomil Perez Gomez
Decano (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad Autónoma de Ica.

Presente. -

De mi especial consideración:

Sirva la presente para saludarla e informar que la **Bach. Cornejo Gadea Laura Fiorella** y **Bach. Mamani Gonzales Dayerli Kaori**, de la Facultad de Ciencias de la Salud, del programa Académico de OBSTETRICIA, han cumplido con elaborar su:

PROYECTO DE TESIS

TESIS

TITULADO:

“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL DESGARRO PERINEAL EN PUERPERAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO – OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III – ESSALUD, JULIACA 2024”

Por lo tanto, queda expedito para continuar con el procedimiento correspondiente para solicitar la emisión de la resolución para la designación de Jurado, fecha y hora de sustentación de la Tesis para la obtención del Título Profesional.

Agradezco por anticipado la atención a la presente, aprovecho la ocasión para expresar los sentimientos de mi especial consideración y deferencia personal. Cordialmente,

Firmado digitalmente por:
REGINALDO HUAMANI Rafael
FAU 20168014062 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/03/2025 21:04:43-0500

Mg. Rafael Reginaldo Huamani
CODIGO ORCID: N° 0000-0002-8326-4276
DNI: 40817543

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

DECLARATORIA DE AUTENCIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Yo, Cornejo Gadea Laura Fiorella, identificado(a) con DNI N° 77200855 y Mamani Gonzales Dayerli Kaori, identificado(a) con DNI N° 74228886 en nuestra condición de estudiantes del programa de estudios de Obstetricia, de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Universidad Autónoma de Ica y que habiendo desarrollado la Tesis titulada: "Factores de riesgo asociados al desgarro perineal en púrpas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud, Juliaca 2024", declaramos bajo juramento que: La investigación realizada es de mi autoría

- a. La tesis no ha cometido falta alguna a las conductas responsables de investigación, por lo que, no se ha cometido plagio, ni auto plagio en su elaboración.
- b. La información presentada en la tesis se ha elaborado respetando las normas de redacción para la citación y referenciación de las fuentes de información consultadas. Así mismo, el estudio no ha sido publicado anteriormente, ni parcial, ni totalmente con fines de obtención de algún grado académico o título profesional.
- c. Los resultados presentados en el estudio, producto de la recopilación de datos son reales, por lo que, el(la) investigador(a) no ha incurrido ni en falsedad, duplicidad, copia o adulteración de estos, ni parcial, ni totalmente.
- d. La investigación cumple con el porcentaje de similitud establecido según la normatividad vigente de la Universidad (no mayor al 28%), el porcentaje de similitud alcanzado en el estudio es del:

13%

Autorizamos a la Universidad Autónoma de Ica, de identificar plagio, autoplagio, falsedad de información o adulteración de estos, se proceda según lo indicado por la normatividad vigente de la universidad, asumiendo las consecuencias o sanciones que se deriven de alguna de estas malas conductas.

Juliaca, 26 de Marzo del 2025

Cornejo Gadea Laura Fiorella
DNI: 77200855

Mamani Gonzales Dayerli Kaori
DNI: 74228886

CERTIFICACIÓN A LA VUELTA →

CERTIFICO: Que las firmas y huellas digitales que anteceden corresponden a: **LAURA FIORELLA CORNEJO GADEA**, identificado (a) con DNI N° 77200855 y **DAYERLI KAORI MAMANI GONZALES**, identificado (a) con DNI N° 74228886. EL Notario que suscribe no asume responsabilidad sobre el contenido del documento D. leg. 1049, de todo lo que Doy Fe. - Juliaca, 26 de marzo del 2025.-----

Jesús Suni Huanca
ABOGADO
NOTARIO DE SAN ROMÁN
JULIACA

← ATENCIÓN A LA VUELTA →

NOTARIA
SUNI HUANCA JESUS
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA

INFORMACIÓN PERSONAL

DNI 77200855
Primer Apellido CORNEJO
Segundo Apellido GADEA
Nombres LAURA FIORELLA

CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado. La segunda impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado.

CORNEJO GADEA, LAURA FIORELLA
DNI 77200855

INFORMACIÓN DE CONSULTA
DACTILAR

Operador: 73359724 - Tobet Tomas
Livisi Vilcapaza

Fecha de Transacción: 26-03-2025
12:07:49

Entidad: 10023807156 - SUNI
HUANCA JESUS

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica3/verification.do>

Número de Consulta: 0112509010

0112508965

**NOTARIA
SUNI HUANCA JESUS
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA**

INFORMACIÓN PERSONAL

DNI 74228886
Primer Apellido MAMANI
Segundo Apellido GONZALES
Nombres DAYERLI KAORI

CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado. La segunda impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado.

MAMANI GONZALES, DAYERLI KAORI
DNI 74228886

**INFORMACIÓN DE CONSULTA
DACTILAR**

Operador: 73359724 - Tobei Tomas
Livi Vilcapaza

Fecha de Transacción: 26-03-2025
12:07:12

Entidad: 10023887156 - SUNI
HUANCA JESUS

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica3/verification.do>

Número de Consulta: 0112508965

DEDICATORIA

A mi padre César, y a mi madre María, por ser mi mayor inspiración y mi apoyo incondicional. Su amor, esfuerzo y sacrificio me han guiado en cada paso de este camino, gracias por creer en mí, por sus palabras de aliento y por estar siempre a mi lado, este logro también es de ustedes con todo mi cariño y gratitud.

Dayerli Kaori

A mi madre Zarela Gadea, pilar fundamental en mi vida, merece reconocimiento por sembrar en mí valores esenciales y creer incansablemente en mi potencial, además de apoyar mi formación intelectual y crecimiento profesional. Este éxito refleja su amor incondicional y sacrificios.

A mi hermana Anabel, con su apoyo inquebrantable, me motivó a no abandonar mis metas.

A mi sobrina Phascal, al ser mi mayor fuente de motivación, me dio la fuerza para superar obstáculos.

A mi compañera de tesis Dayerli, cultivamos una hermosa amistad desde los primeros años de estudio hasta la conclusión de esta etapa académica.

Laura Fiorella

AGRADECIMIENTO

Agradecer en primer lugar a Dios quien nos guió y nos dió fortaleza para seguir adelante, sin él nada sería posible.

A la Universidad Autónoma de Ica por abrimos sus puertas y brindarnos la oportunidad de avanzar en nuestra carrera profesional para obtener el título profesional de Obstetra.

Al Hospital III – Essalud, Juliaca especialmente al servicio de Gineco Obstetricia por brindarnos las facilidades necesarias para la realización de la investigación.

Al Mg. Rafael Reginaldo cuya experiencia, paciencia y apoyo constante fue fundamental para la realización de la tesis, su guía proporciono claridad académica y motivación en momentos de duda.

A nuestra familia, especialmente a nuestros padres les agradecemos profundamente su amor incondicional y su apoyo constante.

RESUMEN

Objetivo. Determinar los factores de riesgo asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco- Obstetricia del Hospital III – ESSALUD, Juliaca 2024.

Metodología. Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, nivel correlacional prospectivo, diseño no experimental descriptivo transversal. La población estuvo constituida por 353 puérperas atendidas en el servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital III – Essalud, Juliaca en el periodo de enero a octubre del 2024 con una muestra censal, muestreo no probabilístico por conveniencia Se utilizó la técnica de ficha recolección de datos, elaborado por los autores sometidos a juicio de expertos y confiabilidad (alfa de Cronbach (0.671). El procesamiento de información se realizó a través del paquete estadístico IBM SPSS Statistics versión 27, utilizando Chi^2 ($p < 0.05$) para establecer la relación entre las variables.

Resultados. Los factores de riesgo materno asociados a desgarro perineal fue la edad materna ($p 0.002$), la anemia materna ($p 0.001$) e itu ($p 0.000$). Los factores de riesgo gineco- obstétricos asociados a desgarro perineal fueron control prenatal ($p 0.008$), psicoprofilaxis ($p 0.000$), paridad ($p 0.027$), el periodo intergenésico ($p 0.011$), inducción ($p 0.002$), episiotomía ($p 0.000$) y presentación fetal ($p 0.018$). El factor de riesgo neonata asociado a desgarro perineal: perímetro cefálico ($p 0.009$)

Conclusiones. Existe relación significativa entre los factores maternos, gineco obstétricos y neonatales con desgarros perineales en puérperas atendidas en el servicio de gineco obstetricia del Hospital, III – Essalud Juliaca 2024.

Palabras claves: Factores de riesgo, desgarro perineal, puérpera.

ABSTRACT

Objective: To determine the risk factors associated with perineal tear in postpartum women attended in the Gynecology and Obstetrics service of Hospital III – ESSALUD, Juliaca, 2024.

Methodology: This was a quantitative study with a descriptive approach, correlational prospective level, and a non-experimental, cross-sectional descriptive design. The study population consisted of 353 postpartum women attended in the Gynecology and Obstetrics service of Hospital III – Essalud, Juliaca, from January to October 2024, using a census sample and a non-probabilistic convenience sampling method. The data collection technique involved a structured data collection form, developed by the authors and subjected to expert evaluation and reliability analysis (Cronbach's alpha = 0.671). Data processing was carried out using IBM SPSS Statistics version 27, applying Chi-square test ($p < 0.05$) to establish relationships between variables.

Results: Maternal risk factors associated with perineal tear included maternal age ($p = 0.002$), maternal anemia ($p = 0.001$), and urinary tract infection ($p = 0.000$). Gynecological-obstetric risk factors associated with perineal tear were prenatal control ($p = 0.008$), psychoprophylaxis ($p = 0.000$), parity ($p = 0.027$), intergenetic period ($p = 0.011$), labor induction ($p = 0.002$), episiotomy ($p = 0.000$), and fetal presentation ($p = 0.018$). The neonatal risk factor associated with perineal tear was cephalic perimeter ($p = 0.009$).

Conclusions: There is a significant relationship between maternal, gynecological-obstetric, and neonatal risk factors and perineal tears in postpartum women attended in the Gynecology and Obstetrics service of Hospital III – ESSALUD, Juliaca, 2024.

Keywords: Risk factors, perineal tear, postpartum women.

ÍNDICE GENERAL

Caratula	i
Constancia de aprobación	ii
Declaratoria de autenticidad	iii
Dedicatoria.....	vii
Agradecimiento	viii
Resumen	ix
Abstract.....	x
Índice general/ índice de tablas académicas y gráficos	xi
I. INTRODUCCIÓN	15
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	17
2.1. Descripción del problema	17
2.2. Pregunta de investigación general	19
2.3. Preguntas de investigación específicas.....	19
2.4. Objetivo General.....	19
2.5. Objetivos específicos.....	20
2.6. Justificación e Importancia	20
2.7. Alcances y limitaciones	22
III. MARCO TEÓRICO	24
3.1. Antecedentes.....	24
3.2. Bases Teóricas.....	30
3.3. Marco conceptual	52
IV. METODOLOGÍA.....	57
4.1. Tipo y nivel de la investigación.	57
4.2. Diseño de Investigación	57
4.3. Hipótesis general y específicas.	58
4.4. Identificación de las variables.....	59
4.5. Matriz de operacionalización de variables.....	60
4.6. Población – Muestra	64
4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de información.	65
4.8. Técnicas de análisis y procesamiento de datos.	66
V. RESULTADOS	67
5.1. Presentación de Resultados.....	67
5.2. Interpretación de resultados	78
VI. ANALISIS DE LOS RESULTADOS	84

6.1. Análisis inferencial.....	84
VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS	89
7.1. Comparación de resultados.....	89
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	91
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	93
ANEXOS.....	103
Anexo 01: Matriz de consistencia	103
Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos	106
Anexo 3: Ficha de validación de instrumentos de medición	110
Anexo 04: Base de datos	116
Anexo 5: Documento de autorización	125
Anexo 6: Evidencia fotográfica.....	128
Anexo 7: Informe de turnitin al 13% de similitud	130

INDICE DE TABLAS

TABLA 1. FACTORES MATERNOS EN PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III – ESSALUD, JULIACA 2024.....	67
TABLA 2. FACTORES GINECO-OBSTÉTRICOS EN PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III – ESSALUD, JULIACA 2024	69
TABLA 3. FACTORES NEONATALES EN PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III – ESSALUD, JULIACA 2024	71
TABLA 4. TIPO DE DESGARRO PERINEAL EN PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III - ESSALUD, JULIACA 2024	72
TABLA 5. FACTORES MATERNOS ASOCIADOS AL DESGARRO PERINEAL A EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III – ESSALUD, JULIACA 2024	73
TABLA 6. FACTORES GINECO-OBSTÉTRICOS ASOCIADOS AL DESGARRO PERINEAL ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III – ESSALUD, JULIACA 2024	75
TABLA 7. FACTORES NEONATALES ASOCIADOS AL DESGARRO PERINEAL ATENDIDAS EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III – ESSALUD, JULIACA 2024.....	77
TABLA 8. PRUEBA DE NORMALIDAD.....	84
TABLA 9. RELACIÓN MEDIANTE CHI – CUADRADO ENTRE FACTORES MATERNOS Y DESGARROS PERINEALES EN PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO – OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III – ESSALUD JULIACA 2024.....	86
TABLA 10. RELACIÓN MEDIANTE CHI – CUADRADO ENTRE FACTORES GINECO – OBSTÉTRICOS Y DESGARROS PERINEALES EN PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO – OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III – ESSALUD JULIACA 2024	87
TABLA 11. RELACIÓN MEDIANTE CHI – CUADRADO ENTRE FACTORES NEONATALES Y DESGARROS PERINEALES EN PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO – OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III – ESSALUD JULIACA 2024.....	88

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. FACTORES MATERNOS EN PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III – ESSALUD, JULIACA 2024	68
FIGURA 2. FACTORES GINECO-OBSTÉTRICOS EN PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III – ESSALUD, JULIACA 2024	70
FIGURA 3. FACTORES NEONATALES EN PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III – ESSALUD, JULIACA 2024	71
FIGURA 4. TIPO DE DESGARRO PERINEAL EN PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III – ESSALUD, JULIACA 2024	72
FIGURA 5. FACTORES MATERNOS ASOCIADOS AL DESGARRO PERINEAL ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III – ESSALUD, JULIACA 2024	74
FIGURA 6. FACTORES GINECO-OBSTÉTRICOS ASOCIADOS AL DESGARRO PERINEAL ATENDIDAS EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III – ESSALUD, JULIACA 2024	76
FIGURA 7. FACTORES NEONATALES ASOCIADOS AL DESGARRO PERINEAL ATENDIDAS EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III – ESSALUD, JULIACA 2024	77

I. INTRODUCCIÓN

Entre las complicaciones del parto vaginal, el desgarro perineal posparto ocupa un lugar significativo, es la segunda causa más frecuente de hemorragia posparto, después de la atonía uterina, caracterizada por un sangrado vaginal abundante activo¹.

De acuerdo con la clasificación propuesta por Sultán y reconocida por la Organización Mundial de la Salud, los desgarros perineales se dividen en cuatro grados. El desgarro de primer grado afecta únicamente la piel, mientras que el de segundo grado compromete los músculos perineales. El tercer grado se subdivide en tres categorías: (A) cuando la lesión afecta menos del 50% del esfínter anal externo (EAE), (B) cuando supera el 50% sin comprometer el esfínter interno y (C) cuando hay daño del esfínter anal interno. Finalmente, el desgarro de cuarto grado es el más severo, ya que involucra la afectación completa del esfínter anal y del epitelio anal. Los desgarros de tercer y cuarto grado se consideran los más graves².

Se estima que más del 85% de las mujeres tuvieron algún tipo de traumatismo perineal durante el parto, causado por la episiotomía o por la ruptura espontánea (desgarro o laceración) de tejidos durante el paso del bebé por la vagina. Los desgarros perineales espontáneos se clasifican en grados según las capas de tejido afectadas³

Este estudio tuvo como objetivo determinar los factores de riesgo asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de gineco - obstetricia del Hospital III, Essalud, Juliaca, durante el año 2024. Para ello, se analizaron en detalle tres dimensiones principales: factores maternos, gineco-obstétricos y neonatales, la investigación se enmarcó en un diseño descriptivo, caracterizando la frecuencia de los desgarros perineales mediante la revisión de historias clínicas, asimismo, se adoptó un enfoque retrospectivo, ya que se consideraron los casos ocurridos entre enero y octubre de 2024, y un diseño transversal, al basarse en datos recopilados

en un único periodo de tiempo, La muestra incluyó puérperas cuya atención de parto fue registrada en la historia clínica, utilizando una ficha de recolección de datos para extraer la información relevante. Además, la estructura del estudio siguió el esquema propuesto por la Dirección de Investigación y Producción Intelectual de la Universidad Autónoma de Ica, organizándose en distintos capítulos que detallan cada aspecto de la investigación.

El estudio se estructura en varios capítulos. El Capítulo I presenta la introducción del estudio. En el Capítulo II, se desarrolla la descripción de la realidad problemática, la formulación del problema general y específico, la justificación del estudio, así como los objetivos generales y específicos, alcances y limitaciones. El Capítulo III aborda los antecedentes de investigación a nivel internacional, nacional, regional y/o local, junto con las bases teóricas y la identificación de variables. El Capítulo IV describe la metodología empleada en la investigación, incluyendo el enfoque, tipo, nivel y diseño del estudio, la operacionalización de las variables, la población y muestra seleccionada, así como las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. En el Capítulo V, se presentan los resultados obtenidos, mientras que el Capítulo VI detalla el análisis e interpretación de dichos resultados, el capítulo VII, detalla la comparación de resultados. Finalmente, el documento concluye con las referencias bibliográficas y los anexos correspondientes.

Las autoras

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Descripción del problema

El parto es el proceso de expulsión del feto cuando alcanza un peso mayor a 500 gramos y ha completado su desarrollo intrauterino, ocurriendo normalmente entre las 37 y 41 semanas de amenorrea, momento en el que la madre ha llegado al término de su embarazo.; durante el parto se puede presentar diversas complicaciones en cual se presenta el desgarro o trauma perineal que es una de las lesiones más frecuentes ocasionada durante la segunda parte del parto vaginal, cuando ya se ha alcanzado la dilatación completa y se lleva a cabo la expulsión del bebé, los desgarros y sus complicaciones si no son tratados adecuadamente, pueden tener graves consecuencias para el bienestar y la calidad de vida de la mujer⁴.

A nivel mundial, el desgarro perineal después del parto vaginal es frecuente y afecta a aproximadamente 9 de cada 10 mujeres; por lo siguiente En las primíparas, los desgarros perineales de segundo grado tienen el doble de probabilidad de presentarse, alcanzando una incidencia del 40%, así como la incidencia del desgarro del esfínter anal es de aproximadamente el 3%, con una tasa significativamente mayor en puérperas primíparas que en multíparas (6% frente a 2%), este es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de incontinencia anal, y aproximadamente el 10% de las mujeres desarrollan síntomas dentro del año posterior al parto vaginal, finalmente los desgarros del esfínter anal tienen implicaciones médico-legales significativas y contribuyen en gran medida a los costos de atención médica⁵.

A Nivel latinoamericano, un estudio realizado en Ecuador en el Hospital Luis Gabriel Dávila en la ciudad de Tulcán analizó 1,095 partos atendidos en un año de los cuales 263 requirieron

episiotomía de estas pacientes 130 presentaron complicaciones inmediatas siendo las más frecuentes los desgarros de segundo y tercer grado seguido de hemorragias entre las complicaciones mediatas se identificaron dolor y hematomas con menor frecuencia mientras que en el puerperio tardío algunas pacientes desarrollaron infecciones que requirieron reingreso al servicio de Ginecología⁶.

En Perú los desgarros perineales son una complicación frecuente durante el parto con una incidencia estimada entre 0,9 y 2,1 por cada 10 mujeres según fuentes oficiales en el último año en una comunidad altoandina se identificó que tres de cada siete madres presentaron esta condición lo que se asocia a limitaciones en el acceso a los servicios de salud¹.

A nivel regional, En Puno existió una alta asociación entre factores de riesgo y desgarro perineal en pacientes atendidas en el Centro de Salud José Antonio Encinas Puno 2018, esta investigación fue representada por 51 pacientes con desgarro perineal en lo cual los resultados fueron los siguientes: Se identificó una relación significativa entre la anemia materna como factor materno y el perímetro cefálico como factor neonatal en la presencia de desgarro perineal sin evidenciarse una asociación con los factores obstétricos al mismo tiempo se determinó que el tipo de desgarro más común fue el de segundo grado en las pacientes atendidas en el Centro de Salud José Antonio Encinas Puno⁷.

En el Hospital III, Essalud – Juliaca, en el servicio de Gineco – Obstetricia; se evidencia la presencia de desgarros perineales con mucha frecuencia lo cual causa preocupación en las mujeres atendidas, sin embargo no hay presencia de estudios que evidencia los factores asociados a los desgarros perineales.

2.2. Pregunta de investigación general

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital III - Essalud, Juliaca 2024?

2.3. Preguntas de investigación específicas

P.E.1:

¿Cuáles son los factores de riesgo maternos asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital III - Essalud, Juliaca 2024?

P.E.2:

¿Cuáles son los factores de riesgo gineco obstétricos asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco- Obstetricia del Hospital III - Essalud, Juliaca 2024?

P.E.3:

¿Cuáles son los factores de riesgo neonatales asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital III - Essalud, Juliaca 2024?

2.4. Objetivo General

Analizar los factores de riesgo asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital III - Essalud, Juliaca 2024.

2.5. Objetivos específicos.

Analizar los factores de riesgo asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital III - Essalud, Juliaca 2024.

O.E.1:

Determinar los factores de riesgo maternos asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital III – Essalud, Juliaca 2024.

O.E.2:

Establecer los factores de riesgo gineco obstétricos asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital III – Essalud, Juliaca 2024

O.E.3:

Explicar los factores de riesgo neonatales asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco- Obstetricia del Hospital III – Essalud, Juliaca 2024

2.6. Justificación e Importancia

Justificación

Justificación teórica: Este enfoque resalta la importancia de la teoría y el marco conceptual detrás del estudio de los factores de riesgo, ligándolo a bases científicas sólidas y prácticas obstétricas, en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III, Essalud, Juliaca 2024, la atención a los casos de desgarro perineal requiere de una base teórica sólida para mejorar los protocolos y reducir las tasas de complicaciones así mismo desde el punto de vista teórico, se considera que ciertos factores

como maternos, gineco – obstétricos y neonatales que influyen en la probabilidad de sufrir desgarros. En este contexto, el estudio de estos factores permite al servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III, Essalud, Juliaca identificar y aplicar prácticas basadas en la evidencia, personalizando la atención a las madres en trabajo de parto para minimizar el riesgo de desgarro y mejorar los resultados obstétricos y el bienestar de las pacientes⁸.

Justificación metodológica: Desde el aspecto metodológico, la investigación sobre el desgarro perineal en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III, Essalud, Juliaca 2024, se enfoca en analizar las variables que inciden en la ocurrencia de esta complicación, Mediante el uso de un enfoque cuantitativo, tipo básico no experimental, se recolectan datos clínicos de casos de partos atendidos en el hospital, lo que permite identificar patrones y factores de riesgo asociados al desgarro perineal. Esto es fundamental para formular estrategias de prevención y protocolos de atención que disminuyan las complicaciones en las pacientes⁹.

Justificación practica o social: Desde el aspecto práctico y social, la investigación sobre el desgarro perineal en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III, Essalud, Juliaca tiene un impacto significativo en la calidad de vida de las mujeres que experimentan esta complicación. Al comprender y reducir los factores de riesgo asociados con el desgarro perineal, es posible implementar prácticas clínicas que no solo mejoren los resultados obstétricos, sino que también reduzcan el dolor, el tiempo de recuperación y el impacto emocional en las pacientes y sus familias, además, estas mejoras en la atención pueden fomentar una mayor confianza en los servicios de salud y

mejorar la percepción de la comunidad sobre la calidad del cuidado materno⁸.

Importancia

El Hospital III Essalud Juliaca es una de las instituciones con mayor demanda en la atención de partos por lo que resulta fundamental identificar los factores relacionados con los desgarros perineales y determinar la frecuencia de sus diferentes grados de severidad con el propósito de reducir las secuelas físicas que afectan a las mujeres después del proceso de parto¹⁰.

2.7. Alcances y limitaciones

Alcances

Alcance temporal. El presente trabajo se realizó en el periodo de enero a octubre del 2024.

Alcance espacial o geográfico: La investigación se desarrolló en el servicio de Gineco – obstetricia del Hospital III – Essalud, Juliaca, ubicado en Av. José Santos Chocano S/N – La Capilla.

Alcance social: La presente investigación trabajó con una muestra censal de 353 puérperas atendidas en el servicio de Gineco – obstetricia del Hospital III – Essalud, Juliaca.

Alcance metodológico: La tesis se desarrolló con un enfoque cuantitativo a nivel básico bajo un diseño no experimental con el propósito de analizar los factores de riesgo relacionados con el desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III Essalud Juliaca durante el año 2024.

Limitaciones

El factor que dificultó el desarrollo de la tesis fue el aspecto administrativo del establecimiento de salud Hospital III - Essalud Juliaca, quien en primer instancia solicitó el convenio entre la universidad y el hospital, sin embargo, se insistió frecuentemente con el responsable del comité de ética logrando acceder al hospital y nos permitió realizar la recolección de datos.

III. MARCO TEÓRICO

3.1. Antecedentes

Internacionales

Abedzadeh M, Talebian A, Sadat Z, Mesdaghinia E. en el año 2019 se realizó un estudio en el hospitales de la ciudad de Kashan titulada “Traumatismo perineal: incidencia y factores de riesgo” por lo cual indica una alta incidencia de trauma perineal y concuerda con la literatura existente de que la edad materna, la paridad, la inducción del parto, la semana de gestación, la fuerza ejercida sobre el fondo uterino y el país de origen, se asocian con el trauma perineal; sin embargo, otros factores no se encontraron como predictores en nuestro estudio. ¿Cuáles son las implicaciones de estos hallazgos para la práctica clínica y/o la investigación futura? Nuestros resultados concordaron con la literatura existente respecto a algunos predictores de trauma perineal pero no con Masa corporal del recién nacido, complicaciones fetales, tiempo transcurrido en la segunda fase del parto, categoría del establecimiento de salud, etc. Estos datos podrían usarse para implementar protocolos para reducir la tasa de episiotomía de rutina, considerando también a las mujeres de alto riesgo para la prevención del trauma perineal¹¹.

Markus H, Karin F, Ayako H, Gunilla T, Hedda D, Kerstin N. En el año 2020 publicaron un artículo titulado “Factores de riesgo de desgarros perineales y vaginales en mujeres primíparas: estudio de cohorte prospectivo POPRACT” por lo siguiente el presente estudio corrobora hallazgos previos de que la extracción con ventosa y el peso fetal superior a 4000 g son factores de riesgo de OASI. Encontramos que la extracción con ventosa es un factor de riesgo de desgarro de segundo grado, y que la extracción con

ventosa, la circunferencia de la cabeza fetal superior a 35 cm y la herencia de disfunción del suelo pélvico y/o deficiencia de tejido conectivo se asociaron con un mayor riesgo de desgarros vaginales altos. Estos hallazgos no se han documentado previamente y deben confirmarse mediante estudios adicionales¹².

Laurita V, et al (10), (Italia,2023), realizaron una investigación con el Objetivo: Evaluar los factores de riesgo asociados con lesiones obstétricas durante el parto. La Metodología: Fue un estudio de cohorte, observacional y retrospectivo. Resultados: se reportaron 81 casos de lesión obstétrica del esfínter anal (0,4%), de los cuales 67 (0,3%) ocurrieron tras el parto vaginal. El riesgo de desgarros graves no fue la duración del segundo periodo del parto (OR= 1,00: p=0,3), el riesgo se redujo al realizar episiotomía medio lateral (OR=0,20: P<0.001), la circunferencia de la cabeza del del bebe (OR= 1,50: p=0,001), la conducción del trabajo de parto (OR =1,13: p=0,6), las mujeres que tuvieron su primer parto presentaron mayor riesgo (ORA= 2,53: p=0,001). Llegaron a la Conclusión: Las mujeres que tuvieron su primer parto tuvieron mayor asociación a desgarros a nivel del esfínter anal¹³.

Herrera Olivarez D.G y Pillajo Flores D.G realizaron un estudio en Quito Ecuador en el año 2018 titulado Factores asociados a desgarros perineales en mujeres hospitalizadas por parto cefalovaginal en el Hospital Carlos Andrade Marín cuyo objetivo fue identificar los factores que influyen en la aparición de desgarros perineales en mujeres atendidas en dicho establecimiento de salud entre enero y julio del 2018 la investigación empleó un diseño transversal analizando a todas las pacientes que tuvieron un parto vaginal en presentación cefálica dentro del periodo de estudio excluyendo aquellas que

fueron sometidas a partos instrumentados o cesáreas en total se evaluaron 658 partos encontrando que el 24,76% de las mujeres presentaron desgarro perineal siendo el de primer grado el más frecuente con una incidencia del 72,26% sin registrarse casos de desgarros de cuarto grado se identificó que los grupos con mayor prevalencia de desgarros perineales fueron las adolescentes menores o iguales a 18 años con un 27,3% las mujeres cuyos recién nacidos pesaban más de 3500 gramos con un 36% y en menor medida aquellas con bebés de bajo peso menor a 2500 gramos con un 14,7% también se evidenció que el perímetro cefálico elevado mayor a 35 cm estuvo presente en el 27% de los casos mientras que los recién nacidos postérmino representaron el 33,3% además las multíparas registraron un 33% y el 81,8% de las mujeres que ingresaron en la fase expulsiva presentaron desgarros perineales otro factor asociado fue la atención del parto por internos de medicina quienes atendieron el 30,5% de los casos con desgarros la conclusión del estudio resalta que los desgarros perineales están relacionados con la edad materna el peso y perímetro cefálico del recién nacido y la experiencia del personal que atiende el parto resaltando la importancia de una vigilancia estricta para reducir este tipo de lesiones perineales¹⁴.

Nacionales

Carmenes D y Zapata M llevaron a cabo un estudio en Piura en el año 2023 con el propósito de identificar los factores maternos y obstétricos relacionados con el desgarro perineal en puérperas que tuvieron un parto vaginal en el Hospital de Paita la investigación se basó en un diseño no experimental retrospectivo y analítico de casos y controles dentro de una población conformada por 154 historias clínicas de pacientes atendidas en el Hospital II-1 NSLMP durante los años 2021 y 2022 los

hallazgos indicaron que del total de mujeres con desgarro perineal el 26% presentaba sobrepeso y el 7.8% obesidad además el 9.1% tenía antecedente de diabetes mellitus el 49.4% había sido diagnosticado con preeclampsia y el 20.8% con corioamnionitis asimismo el 37.7% de los partos fue atendido por internos de medicina el 53.2% de las pacientes recibió oxitocina durante el trabajo de parto el 24.7% de los recién nacidos presentó un perímetro cefálico mayor a 35 cm y el 5.2% tuvo un peso superior a 4000 gramos como conclusión se determinó que no se hallaron factores maternos significativamente asociados con el desgarro perineal sin embargo entre los factores obstétricos identificados se encontraron la atención del parto por internos de medicina el uso de oxitocina durante el trabajo de parto el perímetro cefálico del recién nacido mayor a 35 cm y el peso del recién nacido superior a 4000 gramos¹⁵.

Beretta V realizó en el año 2019 un estudio titulado Factores de riesgo maternos obstétricos y neonatales asociados a desgarros perineales en puérperas atendidas en el Hospital Nacional Sergio Bernalles la investigación tuvo un enfoque observacional analítico retrospectivo con un diseño de casos y controles la muestra incluyó a 228 puérperas de las cuales 57 presentaron desgarro perineal y 171 no lo tuvieron el análisis estadístico se llevó a cabo mediante el programa SPSS versión 25 utilizando la prueba de Chi Cuadrado y el cálculo del Odds Ratio con un nivel de significancia del 5% los resultados mostraron que la edad materna promedio fue de 26,2 años el 89,4% de las participantes tenía 20 años o más la edad gestacional media fue de 39 semanas con un 98,2% de gestaciones de 37 semanas o más la mayoría de las mujeres eran multíparas representando el 84,2% y el peso fetal promedio fue de 3361 gramos con un 71,9% de recién nacidos que superaban los 3300 gramos los principales factores de riesgo identificados fueron la paridad con un valor de

$p=0.000$ y un $OR=4,3$ con un $IC95\%=2,017-9,464$ así como el peso fetal con un $OR=2,3$ $IC95\%=1,2-4,5$ y $p=0.009$ en conclusión los desgarros perineales en puérperas que tuvieron un parto vaginal en el Hospital Nacional Sergio Bernales durante el periodo de enero a julio del 2018 estuvieron asociados principalmente con la paridad y el peso feta⁴.

Gonzales M llevó a cabo en el año 2024 una investigación titulada Factores de riesgo asociados a desgarro perineal severo en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador del 2017 al 2021 en Perú con el objetivo de identificar los factores vinculados a esta complicación en puérperas con parto vaginal atendidas en dicho hospital durante ese periodo el estudio incluyó 15 casos y 3727 controles abarcando a toda la población y utilizando datos proporcionados por el establecimiento de salud se consideraron diversas variables entre ellas las maternas que incluyeron edad paridad anemia e infección urinaria las obstétricas que contemplaron episiotomía maniobras de extracción distocia de hombros inducción del parto operador del parto y controles prenatales y las neonatales que analizaron el peso al nacer y el sexo del recién nacido los resultados indicaron que los factores maternos relacionados con el desgarro perineal severo fueron la edad adulta joven y la nuliparidad mientras que entre los factores obstétricos se identificaron las maniobras de extracción y la distocia de hombros como elementos de riesgo sin embargo no se encontraron factores neonatales asociados a esta condición¹⁶.

Rojas R desarrolló una tesis titulada Factores de riesgos asociados a desgarro perineal en partos eutócicos atendidos en el Centro de Salud Materno Infantil Santa Anita en el año 2020 cuyo propósito fue analizar la relación entre distintos factores de riesgo y la presencia de desgarros perineales en mujeres que tuvieron partos eutócicos en dicho establecimiento de salud

durante ese periodo. Metodología: La presente investigación es de tipo cuantitativo, retrospectivo, transversal, analítico y de caso control. Estudio realizado en el Centro de Salud Materno Infantil Santa Anita en el año 2020. Del total de partos eutócicos atendidos (804), se obtuvo una muestra de 75 casos y 150 controles mediante un muestreo aleatorio simple, con una ficha de recolección de datos. Resultados: Existe asociación estadísticamente significativa entre la variable episiotomía $p=0.000$ (OR: 0.113, IC: 95%: 0.061 - 0.211) que expresa la episiotomía como un factor protector de desgarro perineal (inverso: $1/0.113=8.84$) se considera 8 veces protector, la variable paridad presento no significancia $p=0.025$ (OR: 8.346, IC: 95%: 0.919 - 75.868), por el contrario no existe asociación estadísticamente significativa entre la variable edad materna ($p=0.779$), la variable anemia materna ($p=0.199$), la variable periodo intergenésico ($p=0.170$), la variable tiempo expulsivo ($p=0.315$), la variable psicoprofilaxis ($p=0.822$), la variable peso del recién nacido ($p=1.000$), la variable perímetro ($p=0.693$). Conclusiones: Los factores de riesgos asociados a desgarro perineal en partos eutócicos atendidos en el Centro de Salud Materno Infantil Santa Anita durante el año 2020 fue la episiotomía, que es un factor protector de desgarro perineal; por lo contrario, no existe asociación con la edad materna, la anemia materna, la paridad, periodo intergenésico, tiempo expulsivo, psicoprofilaxis, peso del recién nacido y perímetro cefálico¹⁷.

Locales y regionales

No se encontraron antecedentes relacionados a nivel regional y/o local.

3.2. Bases Teóricas

3.2.1. Variable 1: Factores de riesgo

Definición:

Un factor de riesgo se define como cualquier característica o hábito presente en una persona que incrementa la posibilidad de desarrollar una enfermedad o sufrir una lesión¹⁸.

Los factores de riesgo son características a nivel biológico, psicológico, familiar, comunitario o cultural que preceden y se asocian con una mayor probabilidad de resultados negativos¹⁹.

Se considera factor de riesgo a cualquier característica o condición identificable en una persona o grupo de personas que se relacione con una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad o estar expuesto a un proceso patológico estos factores pueden ser de origen biológico ambiental conductual sociocultural o económico y su combinación puede potenciar su impacto generando un efecto de interacción²⁰.

Teorías relacionadas

La teoría de los condicionantes de la salud explica que la salud de una persona o población no depende solo de factores biológicos, sino también de elementos sociales, económicos, ambientales y culturales. Se basa en la idea de que múltiples factores interactúan para influir en el bienestar y la calidad de vida²¹.

- Principales condicionantes de la salud:

- Biológicos: Genética, edad, sexo, estado inmunológico.
- Estilos de vida: Alimentación, ejercicio, consumo de alcohol, tabaco y drogas.
- Medio ambiente: Contaminación, acceso a agua potable, condiciones de vivienda.
- Sistema de salud: Acceso a servicios médicos, calidad de la atención.
- Factores socioeconómicos: Nivel educativo, empleo, ingresos, redes de apoyo social.

Estos factores pueden actuar de manera positiva o negativa sobre la salud. Las políticas de salud pública buscan mejorar los determinantes negativos para reducir enfermedades y mejorar la calidad de vida de las personas²¹.

Dimensiones.

- ✓ Factores maternos:

En algunos estudios los factores maternos son circunstancias o elementos que incrementan la probabilidad de riesgo a desarrollar diferentes complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio. Se ha demostrado en múltiples estudios que los factores maternos más resaltantes o que tenían una mayor asociación a la lesión del periné eran la edad materna y la anemia, los cuales incrementaron en gran medida la producción de estas lesiones debido a los diferentes cambios estructurales y funcionales que producen estos dos factores²².

Edad: La edad de una mujer influye directamente en los riesgos asociados al embarazo y al parto dentro del campo de la obstetricia se considera que el rango óptimo para la gestación está comprendido entre los 20 y 34 años²³.

Las adolescentes de 19 años o menos presentan un mayor riesgo de complicaciones debido a que su canal del parto aún no ha alcanzado un desarrollo completo además tienen más posibilidades de dar a luz a recién nacidos con bajo peso por otro lado las mujeres de 35 años o más son más propensas a padecer hipertensión arterial diabetes y diversas dificultades durante el parto²³.

Grado de instrucción: El nivel de instrucción de una persona hace referencia al nivel más alto de educación que ha cursado o que está en proceso de completar sin importar si los estudios han sido finalizados o si permanecen de manera temporal o definitiva en estado inconcluso. Las modalidades utilizadas en el CMT son las siguientes²⁴:

- Primarios o menos: incluye a los analfabetos, a las personas que sólo saben leer y escribir y a los que tienen el nivel de estudios primarios o la primera etapa de E.G.B²⁴.
- Secundarios: incluye a las personas que tienen el nivel de estudios equivalente a Bachiller Elemental, Superior, B.U.P. o la segunda etapa de E.G.B²⁴.
- Profesionales: incluye a las personas con estudios de Formación Profesional²⁴.

- Universitarios o Superiores: incluye a las personas que han realizado estudios en Escuelas Universitarias, en Facultades Universitarias o en Escuelas Técnicas Superiores²⁴.

El estado civil: Hace referencia al estado en el que se encuentra una persona en relación con su situación de pareja núcleo familiar o convivencia. Asociados a esta figura legal, se establecen una serie de derechos y obligaciones determinados por el marco jurídico, Se entiende como la condición legal de un individuo en relación con el matrimonio la vida en pareja o las costumbres establecidas esta situación se rige por las normativas vigentes que determinan sus implicaciones y derechos²⁵.

- Tipos de estado civil: En el Perú se reconocen diversas categorías de estado civil que determinan la situación legal de una persona en relación con su vida en pareja o su unión familiar:

Soltero: Se considera soltera a una persona que no ha formalizado un matrimonio ni cuenta con el registro de una unión civil²⁵.

Casado: El estado de casado se refiere a quienes han formalizado su matrimonio conforme a lo establecido por la ley lo que implica el reconocimiento de derechos y el cumplimiento de diversas obligaciones entre ambas partes²⁵.

Conviviente: El estado de conviviente corresponde a una persona que mantiene una relación de pareja y comparte vida en común sin haber formalizado el matrimonio esta condición también conlleva la adquisición de ciertos derechos y responsabilidades legales²⁵.

Zona:

Población urbana: Se define como población urbana a las personas que residen en áreas densamente pobladas donde al menos 100 viviendas están ubicadas de manera continua además se considera urbana a la población que habita en todas las capitales de distrito estas concentraciones pueden incluir uno o más centros poblados con edificaciones cercanas entre sí²⁶.

Población rural: Se considera población rural a quienes residen en las zonas del distrito que se encuentran más allá de los límites de los centros poblados en el área urbana extendiéndose hasta las fronteras del mismo distrito²⁶.

Anemia: La anemia es un factor de riesgo de gran importancia, ya que este incrementa la posibilidad de que la gestante presente múltiples enfermedades y complicaciones durante su gestación, parto y puerperio, alterando la integridad del binomio madre e hijo volviéndolos más vulnerables. Una de las complicaciones más importantes que es el riesgo de presentar desgarro perineal durante el trabajo de parto, debido al bajo aporte de oxígeno y nutrientes en los diferentes tejidos de la vagina y el periné, haciéndolos débiles y menos resistentes a la presión que ejerce el feto durante el parto²⁷. En múltiples estudios se evidencio que el 44,2% de gestantes con anemia presentaron desgarro perineal. Según este dato, se puede observar que existe una relación significativa entre la anemia y la producción de los desgarros perineales. Esta relación se sustenta bajo el concepto de que los tejidos con poca perfusión sanguínea o poco flujo sanguíneo son muy frágiles y tienden a romperse debido a la hipoxia y baja nutrición que produce la anemia pregestacional, asimismo influye en la frialdad de los tejidos del suelo pélvico¹⁶.

La anemia se define como una reducción en los niveles de hemoglobina en la sangre en el caso de las mujeres embarazadas esta condición se diagnostica cuando la hemoglobina es inferior a 11 g/dl y el hematocrito está por debajo del 33%²⁸. Su clasificación se establece según la concentración de hemoglobina identificándose cuatro categorías:

- Ausencia de anemia cuando los niveles son superiores a 11.0 g/dl
- Anemia leve cuando oscilan entre 10.0 y 10.9 g/dl
- Anemia moderada cuando se encuentran entre 7.0 y 9.9 g/dl
- Anemia severa cuando la hemoglobina es menor de 7.0 g/dl²⁸

Infecciones del tracto urinario (ITU): son la segunda patología más frecuente en embarazadas y un factor de riesgo significativo son los cambios anatómicos, fisiológicos y de inmunosupresión que ocurren en gestantes, durante este periodo, el útero crece y produce un estrechamiento de la vejiga y un aumento de la frecuencia urinaria. A nivel fisiológico, la progesterona aumenta y causa estasis acompañada de dilatación y peristalsis ureteral, lo que genera un entorno óptimo para el crecimiento bacteriano²⁹.

Clasificación de la ITU en función de la historia natural y de los procedimientos diagnósticos o tratamientos necesarios³⁰:

- 1) bacteriuria asintomática → Bacteriuria asintomática
- 2) cistitis aguda en mujeres → Cistitis no complicada

- 3) cistitis recurrente en mujeres → Cistitis recurrente en la mujer
- 4) PNA no complicada en mujeres → Pielonefritis aguda (PNA) no complicada
- 5) ITU complicada → Infección urinaria complicada.

IMC: El índice de masa corporal conocido como IMC es una medida que establece la relación entre el peso y la estatura de una persona y se emplea comúnmente para determinar si un adulto presenta bajo peso o sobrepeso su cálculo se realiza dividiendo el peso en kilogramos entre la talla en metros elevada al cuadrado según la Organización Mundial de la Salud se clasifica en cuatro categorías considerándose bajo peso cuando el IMC es menor de 18.5 normopeso cuando se encuentra entre 18.5 y 24.9 sobrepeso cuando varía entre 25 y 29.9 y obesidad cuando supera los 30 diferenciándose en distintos grado³¹.

Según la Organización Mundial de la Salud las mujeres en buen estado de salud y con una alimentación adecuada deberían aumentar entre 10 y 14 kilogramos durante el embarazo para minimizar el riesgo de complicaciones además se aconseja que aquellas con un IMC menor a 18.5 procuren acercarse al límite superior de esta recomendación mientras que las mujeres con un IMC superior a 25 clasificadas como con sobrepeso u obesidad restrinjan su ganancia de peso al límite inferior recomendado de 10 kilogramos³¹.

✓ Factores gineco-obstétricos

Los factores obstétricos son condiciones o situaciones que se asocia con un riesgo anormal de poseer o aumentar la morbimortalidad durante el embarazo, parto y puerperio, en las

gestantes estos factores están relacionados con las lesiones perineales incluyen el tiempo que dura de un embarazo a otro, la paridad, el peso del bebe, episiotomía durante en el embarazo³²

Control prenatal: La atención prenatal es un componente fundamental dentro de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva el Ministerio de Salud la define como el seguimiento y evaluación integral tanto de la gestante como del feto realizado por profesionales de salud con el propósito de garantizar el nacimiento de un recién nacido en óptimas condiciones sin comprometer la salud materna el control prenatal se refiere al conjunto de consultas programadas entre la embarazada y el equipo de salud con la finalidad de monitorear el desarrollo de la gestación y preparar adecuadamente a la madre para el parto y la crianza para que este proceso sea eficaz es necesario que cumpla con cuatro criterios esenciales³³.

Psicoprofilaxis: La psicoprofilaxis es un programa educativo dirigido a mujeres embarazadas con el propósito de prepararlas para el momento del parto brindándoles orientación para tomar decisiones informadas y responsables en relación con la gestación el parto el posparto y la alimentación del recién nacido el acompañamiento emocional dentro de este proceso contribuye a reducir la ansiedad frecuente en la etapa final del embarazo además el parto natural favorece un vínculo estrecho con el bebé y facilita la lactancia ya que la participación activa de la madre fortalece su conexión emocional con el recién nacido las sesiones de psicoprofilaxis suelen incluir ejercicios de Kegel que preparan el perineo para el trabajo de parto¹⁰.

Paridad: La edad gestación se define como el tiempo que dura la gestación desde el primer día del último periodo de la menstruación, el cual es expresado en semanas de gestación

más días de gestación³⁴. Según un estudio menciona que presentaron desgarro perineal en un 12,7% en mujeres que iniciaron su atención prenatal pasadas 12 semanas de gestación esto asociado que las mujeres que inician un control prenatal tardío no reciben una atención adecuada, en la mayoría de los casos no se diagnostican oportunamente las infecciones que presentan haciendo que sean más predisponentes para desarrollar la lesión perineal¹. En múltiples estudios se llegó a evidenciar que la edad gestacional es un factor obstétrico que posee gran asociación con los desgarros perineales, la relación de estas es proporcional, ya que a mayor edad gestacional existe mayor riesgo de sufrir desgarros perineales, refiriéndonos específicamente a edades gestacionales superiores a 39 semanas³⁵.

Periodo intergenésico: El periodo intergenésico se refiere al intervalo de tiempo entre el final de un embarazo y el inicio de una nueva gestación diversos estudios sugieren que este periodo debe ser de al menos dos años siendo lo ideal un intervalo de entre dos y cinco años ya que cuando el tiempo entre embarazos es inferior a dos años existe un mayor riesgo de complicaciones un periodo intergenésico corto es considerado inadecuado debido a que el cuerpo de la mujer requiere este tiempo para recuperarse completamente mediante el puerperio y los cambios anatomo-fisiológicos asociados³³.

Edad Gestacional: La clasificación del recién nacido varía según la edad gestacional al momento del nacimiento considerándose pretérmino a aquel que nace entre las 28 y menos de 37 semanas de gestación inmaduro cuando la gestación se ha desarrollado entre las 21 y 27 semanas o su peso oscila entre 500 y menos de 1000 gramos prematuro al que tiene entre 28 y 37 semanas con un peso entre 1000 y menos de 2500 gramos a

término si el nacimiento ocurre entre las 37 y 41 semanas con un peso igual o superior a 2500 gramos y postérmino cuando la gestación se extiende a 42 semanas o más además se considera con bajo peso al recién nacido cuyo peso al nacer es menor de 2500 gramos sin importar su edad gestacional³⁶.

Inducción: El inicio inducido del trabajo de parto es una práctica frecuente en obstetricia cuya aplicación se ve influenciada por las transformaciones en el perfil epidemiológico y social de la población gestante a nivel global³⁷.

Periodo expulsivo prolongado: El tiempo que dura el trabajo de parto es un aspecto fundamental ya que el periodo expulsivo se considera un factor de riesgo un parto demasiado rápido o prolongado puede generar diversas complicaciones entre ellas el desgarro perineal la exposición repentina de la cabeza fetal en el periné es un elemento determinante en la aparición de esta lesión de acuerdo con la ACOG la duración promedio del periodo expulsivo es de 50 minutos en mujeres nulíparas y de 20 minutos en mujeres multíparas³⁸.

Episiotomía: Es un procedimiento quirúrgico común que implica en seccionar el musculo mucosa y piel para agrandar el canal del parto y favorecer la salida del feto. Su finalidad es evitar los traumas perineales y complicaciones fetales durante el parto, la episiotomía tiene ventajas y desventajas, así mismo se ve un menor riesgo de traumas vaginales, pero también hay un mayor efecto de lesiones de periné de grado tres o cuarto grado que causan efectos adversos prolongados³⁹.Un estudio realizado en España demostró que la episiotomía media era un factor de riesgo de desgarros de tercero y cuarto grado en relación con la episiotomía media lateral lo que reducía el riesgo de desgarros⁴⁰.

- Episiotomía rutinaria :

Es un corte que se realiza en todas las mujeres gestantes sin una justificación médica específica, especialmente en aquellas que están en su primer embarazo. Actualmente, esta práctica se lleva a cabo de manera rutinaria y es ampliamente conocida y aplicada en partos vaginales en todo el mundo. No obstante, en sus inicios, solo se utilizaba en casos de partos complicados. Con el tiempo, se han identificado diversas complicaciones asociadas a esta intervención en la zona del perineo⁴¹.

- Episiotomía selectiva:

Es la realización selectiva de la episiotomía solo en aquellos casos donde se comprometa un daño tanto para la madre como para el bebé. Para ello dicho procedimiento solo debe ser aplicado selectivamente cuando exista una indicación médica previa⁴¹.

Tipos de episiotomía:

- Media, Mediana o Central: Es un tipo de incisión que comienza en la horquilla vulvar en dirección hacia el cuerpo perineal terminando antes de alcanzar el esfínter externo del ano la incisión presenta una longitud que oscila entre 2 y 3 cm dependiendo de la longitud del periné y el grado de adelgazamiento del tejido. Es el tipo de episiotomía más utilizada en América del Norte y un 30% en Francia. aunque es menos usada por que tiene más riesgos de complicaciones si se desgarran el esfínter anal, tiene también beneficios, en cuanto a menos sangrado, menos dolor en el postparto ya que es una zona con mayor tejido conjuntivo y menos vasos sanguíneos. La

técnica para suturar es más sencilla y la cicatrización es más rápida⁴¹.

- Mediana lateral: La incisión parte de la línea media de la horquilla y sigue un trayecto diagonal en el periné hacia la espina ciática (ángulo de 45°), se extiende unos 4cm lateralmente, alejándose del recto y evitando posibles desgarros. Es comúnmente usada en Europa, Reino Unido y en Perú.⁴³ Su cicatrización es lenta, más pérdida de sangre y el tipo de sutura es más difícil, ya que puede dejar sensibilidad muy dolorosa que conlleva a dispareunia en el postparto⁴¹.

- Lateral: Esta incisión se origina en el labio mayor en la unión de sus dos tercios anteriores con el tercio posterior y se extiende en dirección diagonal hacia la tuberosidad isquiática atravesando todos los tejidos del labio mayor su realización genera una mayor pérdida de sangre y la sutura suele causar más dolor en el periné siendo el tipo de episiotomía más frecuente en Finlandia⁴¹.

Presentación fetal: La posición fetal ideal para el parto es cuando el feto está con la cabeza hacia abajo, mirando hacia tu espalda, Con el mentón apoyado sobre el pecho y la parte posterior de la cabeza alineada para ingresar a la pelvis. Esto se llama presentación cefálica u occipito anterior. La mayoría de los fetos adoptan esta posición en la semana 36 del embarazo. Otras posiciones fetales, como la presentación de nalgas, hacen que el parto vaginal sea más complicado⁴².

Presentación compuesta: El embarazo puede ser un momento de alegría, reflexión y anticipación ansiosa. Nadie espera complicaciones, pero el 8% de los embarazos las tienen. Una de esas complicaciones es la presentación compuesta, que ocurre cuando un feto está posicionado anormalmente en el canal de

parto. Lo óptimo es que un feto se desplace por el canal de parto de cabeza, mirando hacia la espalda de la madre. Sin embargo, la presentación compuesta significa que un feto generalmente está posicionado con un brazo, mano, pie o pierna cerca de la parte del cuerpo más cercana a la abertura del canal de parto, como la cabeza o las nalgas. Por ejemplo, si la cabeza de un bebé está más cerca del canal de parto, entonces un brazo posicionado al lado de la cabeza es una manifestación común de la presentación compuesta⁴³.

✓ Factores neonatales

Los factores neonatales son elementos que pueden llegar a incrementar los desgarros perineales, las características físicas en el recién nacido como el peso del bebé que nació es un factor para desarrollar una lesión perineal, esto se debe a la ampliación que realiza el recién nacido con peso mayor, sea más pesado o liviana. Otra característica es la circunferencia cefálica fetal mayor a lo normal que conlleva a un desgarro perineal¹⁶.

Sexo: investigaciones recientes realizadas en la India durante la última década indican una mayor incidencia de desgarros perineales en madres puérperas cuyos bebés son de sexo masculino sin embargo Díaz sostiene que no hay una diferencia significativa relacionada con el sexo del recién nacido²².

Peso del recién nacido: El peso del recién nacido influye en el grado de estiramiento que se genera durante la fase expulsiva del parto un bebé con mayor peso requiere más espacio para su nacimiento en comparación con uno de peso normal además a medida que el peso del bebé aumenta también se incrementa el riesgo de presentar un desgarro perineal⁴⁴.

Perímetro cefálico: Se considera en diversos estudios como la medida de la circunferencia cefálica fetal, el perímetro cefálico pertenece a los factores neonatales que se asocia a las lesiones en el periné. La cabeza neonatal de gran tamaño conlleva a producir desgarro en el periné así mismo el perímetro cefálico mayor de 35 cm se asoció a los desgarros⁴⁴.

3.2.2. Variable 2: Desgarro perineal

Definición:

El desgarro perineal corresponde a una lesión que afecta la región del perineo y que ocurre durante el parto esta lesión puede ser causada por el paso del feto a través del canal de parto así como por la presión y fuerza aplicadas durante la manipulación obstétrica puede presentarse de manera espontánea en el parto o como una extensión de la episiotomía este tipo de trauma se registra en aproximadamente el 65% de los partos vaginales²².

El desgarro perineal se considera una complicación del parto caracterizada por una ruptura en la continuidad de los tejidos que puede presentarse con contusiones leves afectación de los músculos o laceraciones más profundas con o sin pérdida de tejido en algunos casos esta lesión puede extenderse desde las estructuras del periné hasta el diafragma urogenital².

Teorías relacionadas

La teoría de causalidad del modelo de Bradford-Hill (1965) establece criterios para identificar relaciones causales en enfermedades no infecciosas. Estos incluyen la fuerza de asociación, que mide la relación entre la causa y el efecto en función del riesgo relativo (RR); consistencia, que verifica la

repetición de la asociación en diferentes estudios; especificidad, que sugiere que una causa genera un efecto particular, aunque no siempre es aplicable; temporalidad, que exige que la causa preceda al efecto, aunque su comprobación puede ser difícil; y gradiente biológico (dosis-respuesta), que indica que la frecuencia de la enfermedad aumenta con la exposición, salvo excepciones como umbrales o sesgos. Además, se considera la plausibilidad biológica, que requiere que la causa tenga una explicación lógica en el contexto científico; la coherencia, que relaciona los hallazgos con la historia natural de la enfermedad; la evidencia experimental, que tiene alta validez, pero es difícil de obtener en humanos; y la analogía, que sugiere que factores similares pueden generar efectos similares. Otros aspectos adicionales incluyen el análisis de la población, la variación del efecto en distintos grupos, la reversibilidad del daño al eliminar la causa y un juicio crítico basado en evidencia científica⁴⁵.

La teoría de causalidad según el modelo de Rothman, desarrollado en epidemiología y adaptado a métodos estadísticos multivariantes, se basa en relaciones multicausales y define como causa cualquier evento, condición o característica esencial para generar un efecto. Distingue entre causas componentes, suficientes y necesarias, estableciendo que ninguna causa componente es superflua, que un efecto puede originarse por múltiples causas suficientes y que una causa componente puede pertenecer a varias causas suficientes de un mismo efecto. Si una causa componente está presente en todas las causas suficientes de un efecto, se considera necesaria. Además, una misma causa componente puede intervenir en distintas causas suficientes de efectos diferentes. Cuando dos causas componentes forman parte de una causa suficiente, interactúan biológicamente, y su grado de interacción puede depender de otros factores⁴⁶.

Dimensiones.

Ante la presencia de desgarros perineales es fundamental realizar una exploración minuciosa que permita su correcta clasificación y reparación estos se dividen en cuatro grados conforme a los criterios establecidos por el RCOG⁴⁷

El desgarro perineal se clasifica en diferentes grados según la profundidad de la lesión el primer grado afecta únicamente la piel del periné y puede o no comprometer la mucosa vaginal el segundo grado involucra los músculos perineales sin dañar el esfínter anal el tercer grado implica lesión en el esfínter anal y se subdivide en tres categorías la tipo 3a cuando menos del 50% del esfínter externo está afectado la tipo 3b cuando el daño supera el 50% de su grosor y la tipo 3c cuando se comprometen tanto el esfínter externo como el interno finalmente el cuarto grado se caracteriza por la afectación del esfínter anal junto con la mucosa rectal⁴⁷.

Esta clasificación permite evaluar la gravedad del desgarro y estimar su pronóstico:

- Los desgarros de primer grado suelen cicatrizar sin consecuencias⁴⁷
- Los desgarros de segundo grado pueden limitarse a los músculos del periné o extenderse hasta el músculo elevador del ano durante la segunda fase del parto las fibras pubococcígeas y puborrectales del músculo elevador del ano experimentan una gran tensión que puede provocar su avulsión esta condición se presenta en el 20% de los partos eutócicos en el 30% de los partos asistidos con ventosa y en el 50% de los partos con fórceps la avulsión de este músculo se considera un factor de

riesgo para el desarrollo de prolapso de órganos pélvicos por lo que su identificación durante el parto es fundamental para remitir a las pacientes a una evaluación perineal especializada⁴⁷

- Los desgarros perineales de tercer y cuarto grado también conocidos como OASIS representan la principal causa de incontinencia anal en mujeres jóvenes su prevalencia se estima en un 2.9% de los partos con un rango que varía entre 0.5% y 11% afectando al 6% de las nulíparas y al 1.7% de las multíparas el riesgo de incontinencia anal es el doble en los desgarros de grado 3c en comparación con los de grado 3b y estos a su vez presentan el doble de riesgo en relación con los de grado 3a cuando existe duda en la clasificación del desgarro entre 3a y 3b se recomienda optar por la categoría más grave la identificación precisa y la reparación adecuada de estas lesiones han contribuido a una reducción significativa de los síntomas de incontinencia anal en las pacientes tras la reconstrucción del esfínter externo entre el 60% y 80% de las mujeres permanecen asintomáticas al cabo de un año sin embargo la prevalencia de incontinencia anal a largo plazo es el doble en comparación con aquellas sin antecedentes de OASIS entre las pacientes sintomáticas los problemas más comunes incluyen incontinencia de gases y urgencia defecatoria⁴⁷

Existen ciertas lesiones que no encajan dentro de la clasificación habitual en algunos casos se puede identificar una afectación en la mucosa rectal sin comprometer la integridad del esfínter anal interno ni externo su correcta reparación es fundamental ya que una inadecuada intervención podría derivar en complicaciones como la formación de fístulas rectovaginales⁴⁷

Diagnóstico del desgarro perineal intraparto: Los desgarros perineales están infradiagnosticado, para identificarlos

correctamente, se debe de seguir una sistemática de exploración, siendo preciso: – Posición de litotomía. – Buena fuente de luz. – Analgesia adecuada. Es importante diagnosticar una lesión en el músculo elevador del ano es fundamental realizar una exploración mediante la palpación de las paredes laterales del periné es necesario evaluar la discontinuidad de sus fibras y la posible presencia de grasa entre ellas siendo este último el signo más característico de su rotura con el fin de mejorar la precisión de la exploración se recomienda realizar un tacto rectal con el dedo índice junto con una palpación digital del esfínter utilizando el pulgar para examinar el periné este procedimiento permite un mejor acceso a la zona afectada al desplazar el dedo índice hacia el cuerpo perineal facilitando así la detección de la lesión. La identificación del desgarro del esfínter externo siempre es más fácil que la del interno, aunque en algunas ocasiones el desgarro completo del esfínter externo puede retraerse y se debe localizar para su correcta sutura. Para ello, es útil recordar que el esfínter externo tiene un color rojizo mientras que el interno es blanquecino. Se ha evidenciado que cuando un equipo obstétrico mejora su entrenamiento en el diagnóstico de los desgarros perineales posparto aumenta significativamente el número de los desgarros diagnosticados. Este hecho pone de manifiesto la existencia de lesiones que pasan sin diagnosticar por la falta del adiestramiento en el diagnóstico (NE = III). Por ello, es importante la formación de cualquier profesional que asista partos en la identificación de las lesiones⁴⁸

Reparación de las lesiones obstétricas:

La reconstrucción del periné tras un desgarro o una episiotomía es una de las intervenciones quirúrgicas más comunes en obstetricia el uso de una técnica adecuada en este procedimiento

puede disminuir la incidencia de complicaciones como dolor perineal crónico dispareunia prolapso de órganos pélvicos e incontinencia anal antes de proceder con la sutura es fundamental identificar las estructuras anatómicas afectadas incluyendo la mucosa vestibular en la región anterior del periné la mucosa vaginal el músculo elevador del ano los músculos superficiales perineales como el bulbocavernoso y el transverso superficial del periné el esfínter anal y la piel perineal para una reparación efectiva es esencial contar con una iluminación adecuada garantizar una correcta visualización del área afectada aplicar medidas de asepsia como el lavado el uso de clorhexidina acuosa y el cambio de guantes administrar una anestesia apropiada y disponer de los instrumentos quirúrgicos y materiales de sutura necesarios⁴⁷

a) Lesiones de primer y segundo grado junto con afectaciones en el músculo elevador del ano:

El uso de material de absorción rápida ha demostrado ser eficaz en la reducción del tiempo de dolor perineal y la dispareunia a largo plazo:

1. Las lesiones cuyos bordes están alineados y no muestran sangrado activo no requieren sutura⁴⁷.
2. Las lesiones que presenten sangrado o cuyos bordes no se encuentren correctamente alineados deberán ser suturadas utilizando material sintético trenzado de absorción rápida como la poligalactina 910 específicamente Novosyn Quick 3/0 con aguja cilíndrica ½ HR de punta cilíndrica y 70 cm de longitud o un material similar la sutura se realizará mediante puntos simples⁴⁷.

Desgarros y episiotomías correspondientes a lesiones de segundo grado:

El uso de sutura continua en la reparación de lesiones perineales de segundo grado ha demostrado ser más efectivo en la reducción del tiempo de dolor en comparación con las técnicas de sutura discontinua además cuando se emplea este método en todas las capas afectadas la disminución del dolor es aún más significativa la técnica recomendada consiste en una sutura continua en triple capa que abarca la mucosa vaginal la musculatura superficial del periné y la piel perineal⁴⁷.

Material de sutura: El material recomendado para la sutura es un hilo sintético multifilamento trenzado de absorción rápida elaborado con ácido poliglicólico específicamente PGA Rapid (Aragó) en calibre 2/0 con aguja cilíndrica de punta trócar de 37 mm y 90 cm de longitud en casos de desgarros más profundos como aquellos producidos por el uso de fórceps se puede emplear el mismo material en calibre 0 con aguja cilíndrica de punta trócar de 40 mm y 90 cm de longitud si la paciente presenta antecedentes de rechazo o alergia a la sutura de ácido poliglicólico se optará por el uso de un material monofilamento absorbible actualmente se dispone de PDO (Aragó) en calibre 2/0 con aguja cilíndrica de punta trócar de 37 mm y 70 cm de longitud⁴⁷.

Descripción de la técnica:

- Reparación de la mucosa vaginal mediante sutura:

Para la sutura de la mucosa vaginal es fundamental identificar el ángulo del desgarro el primer punto de anclaje debe situarse entre 0.5 y 1 cm por encima de este posteriormente se realizará

una sutura continua sin cruzar desde el ángulo hasta el anillo himenal asegurando la inclusión de la mucosa vaginal y la fascia vagino-rectal solo en caso de ser necesario para lograr hemostasia se utilizará una sutura continua con puntos cruzados el último punto se aplicará a nivel de la mucosa vestibular una vez sobrepasado el anillo himenal insertando la aguja en la mucosa vestibular y extrayéndola hasta alcanzar las fibras más profundas del músculo bulbocavernoso⁴⁷.

- Reparación de los músculos perineales incluyendo el bulbocavernoso y el transverso superficial del periné mediante sutura:

Proseguir con una sutura continua sin cruzar hasta alcanzar el borde distal de la herida perineal asegurando la correcta alineación de ambos lados de la lesión para la sutura de la piel se deberá regresar hacia las carúnculas himenales empleando una técnica de sutura continua subcutánea o intradérmica al llegar a las carúnculas se debe sobrepasarlas internamente y fijar el nudo en la mucosa vaginal⁴⁷.

- Afectación del músculo elevador del ano:

La detección de una lesión en el músculo elevador del ano es fundamental y se identifica por la discontinuidad de sus fibras junto con la presencia de grasa proveniente de la fosa isquiorectal siendo este último el indicador más claro de su rotura debido a que los extremos lesionados tienden a retraerse su reparación puede resultar compleja para facilitar su localización se recomienda el uso de pinzas atraumáticas como Foester o Allis con el objetivo de unir los segmentos mediante puntos sueltos el material de sutura indicado es un hilo sintético multifilamento trenzado de absorción normal en calibre 2/0 o 0

actualmente se dispone de sutura sintética de absorción estándar PDO (Aragó) en calibre 2/0 con aguja cilíndrica de 37 mm y 70 cm de longitud en casos de desinserción del músculo elevador del ano el extremo inferior puede ser fijado nuevamente al arco tendíneo que se asemeja a una cuerda debido a su engrosamiento de la fascia del músculo obturador interno actuando como un tendón al cual se inserta la porción ileococcígea del músculo elevador del ano al reconstruir esta estructura el tejido muscular vuelve a superponerse sobre la grasa en situaciones donde los extremos no sean localizables la sutura no será posible y no se recomienda aplicar puntos a ciegas es importante documentar la sospecha de lesión en el informe de partos y en la historia obstétrica ya que la afectación del músculo elevador del ano es un criterio para su derivación a la consulta perineal con el fin de realizar un seguimiento posparto⁴⁷.

b) Lesiones de tercer y cuarto grado:

Es fundamental realizar de manera sistemática un tacto rectal con el dedo índice junto con una palpación digital del esfínter utilizando el pulgar para examinar el periné este procedimiento permite una mejor visualización de la zona afectada al desplazar el dedo índice hacia el cuerpo perineal el esfínter interno se distingue como una banda fibrosa de tonalidad blanquecina ubicada entre la mucosa rectal y el esfínter externo aunque su identificación puede ser complicada en la fase aguda estas fibras representan aproximadamente el 75% del tono anal necesario para mantener la continencia por otro lado el esfínter externo puede no ser fácilmente visible en un primer momento debido a su retracción lateral tras la sección está compuesto por fibras de musculatura estriada con disposición circular que rodean el esfínter interno⁴⁷.

3.3. Marco conceptual

- Anemia: La anemia es un problema que se produce cuando no tienes suficientes glóbulos rojos sanos o hemoglobina para transportar oxígeno a los tejidos del cuerpo. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y transporta el oxígeno desde los pulmones a los demás órganos del cuerpo⁴⁹
- Controles prenatales: Es la atención médica de la mujer durante toda la fase del embarazo, siendo ofrecido tanto por el sistema de salud público como por el privado. Durante las consultas prenatales, el médico debe aclarar todas las dudas de la mujer sobre el embarazo y sobre el parto, así como ordenar exámenes para verificar si esta todo bien con la madre y el bebé⁵⁰
- Desgarro perineal: La pérdida de continuidad en el tejido del canal del parto, como ocurre en los desgarros perineales, es una complicación posparto frecuente y grave. Se trata de la segunda causa más común de hemorragia después del parto, justo después de la atonía uterina. Esta condición puede implicar desde pequeñas contusiones hasta laceraciones más severas, afectando estructuras perineales y potencialmente causando problemas a largo plazo, como incontinencia urinaria o fecal⁵¹.
- Edad gestacional: La duración del embarazo se determina desde el primer día de la última menstruación regular hasta el momento del nacimiento o el evento gestacional que se está evaluando, esta duración se mide en semanas y días completos. Por lo general, un embarazo completo dura alrededor de 40 semanas, lo que equivale a aproximadamente 280 días. La edad gestacional es fundamental para evaluar el desarrollo del feto y planificar el cuidado prenatal adecuado⁵².

- Edad materna: La edad de la madre, si es menor de 19 años o mayor de 35, representa un riesgo obstétrico tanto para ella como para el recién nacido. Las mujeres embarazadas de 35 años o más tienen un mayor riesgo de dar a luz a bebés con alteraciones genéticas y de enfrentar complicaciones durante el parto⁵³
- Estado civil: El estado civil de una persona se refiere a su situación legal en cuanto a nacimiento, nacionalidad, filiación o matrimonio, y se documenta en el Registro Civil. Este estado define los límites de poder y responsabilidad que el derecho otorga a las personas naturales, determinando su capacidad legal para realizar acciones y asumir obligaciones⁵⁴.
- Episiotomía: La episiotomía es una técnica quirúrgica que consiste en realizar una incisión en el perineo durante el proceso de parto, con el objetivo de aumentar el diámetro vaginal y facilitar el nacimiento. Este procedimiento se lleva a cabo con instrumentos como tijeras o bisturí, y luego se requiere una sutura para reparar los tejidos afectados⁵⁵
- Factor de riesgo: Un factor de riesgo es cualquier rasgo o situación identificable que aumenta la probabilidad de que una persona o grupo desarrolle o padezca una enfermedad. Estos factores están relacionados con un tipo específico de daño a la salud y pueden estar presentes en individuos, familias, comunidades o en el ambiente en general²².
- Factor gineco-obstétricos: son condiciones médicas o sociodemográficas que pueden aumentar la morbimortalidad materna y fetal durante el embarazo, parto y puerperio¹⁶
- Factor materno: Los factores maternos incluyen indicadores que describen a las mujeres en términos de edad, raza o etnia, sexo,

género, nivel educativo en el idioma principal, situación laboral, ingresos, profesión, estado civil, condición de vida, y otros factores similares. Estos indicadores ayudan a caracterizar demográfica y socialmente a las madres, proporcionando información valiosa sobre su contexto y situación²².

- Grado de instrucción: El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela)⁵³
- IMC: El índice de masa corporal (IMC) es una manera estándar de determinar si un adulto tiene el peso correcto en relación a su estatura. Para obtener el IMC, se debe dividir el peso de la persona (colocado en kilogramos), entre su talla (colocada en metros) al cuadrado⁵⁶
- Inducción de parto: La inducción del trabajo de parto significa hacer que el útero se contraiga antes de que el trabajo de parto empiece de forma natural⁵⁷
- Infección del tracto urinario (ITU): es la presencia en las vías urinarias, por encima del esfínter de la vejiga urinaria, de microorganismos que crecen en medios de cultivo utilizados de manera rutinaria en laboratorios microbiológicos³⁰.
- Paridad: la paridad generalmente se refiere a la igualdad o simetría en la distribución de características entre diferentes grupos. Sin embargo, en el contexto de la salud reproductiva, la paridad se define como el número de partos después de las 20 semanas de gestación. En otros contextos, como la paridad de género, se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres en representación política o social. En estudios demográficos más amplios, la paridad podría implicar la comparación de tasas o

proporciones entre diferentes grupos demográficos para evaluar equidad o igualdad⁵⁸.

- **Perímetro cefálico:** La medición del perímetro cefálico implica rodear la circunferencia más amplia de la cabeza de un niño, desde la región justo por encima de las cejas y las orejas hasta la parte trasera de la cabeza. Esta medición es crucial para evaluar el crecimiento cerebral y detectar posibles anomalías en el desarrollo⁵⁹.
- **Periodo expulsivo:** Es la etapa que transcurre desde que el cuello uterino alcanza su dilatación completa hasta el momento en que el bebé nace. Durante este periodo, la mujer experimenta un impulso involuntario de empujar, provocado por las contracciones expulsivas del útero²².
- **Periodo intergenésico:** El periodo intergenésico se define como el intervalo de tiempo que transcurre entre la fecha del último acontecimiento obstétrico y el comienzo de un nuevo embarazo⁶⁰.
- **Peso del recién nacido:** De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el peso al nacer se refiere al primer registro del peso del recién nacido inmediatamente después del parto este factor influye en su estado de salud pudiendo determinar tanto su bienestar como la posible aparición de complicaciones al momento del nacimiento o en etapas posteriores⁶¹.
- **Presentación fetal:** La parte que se presenta es aquella porción del cuerpo fetal que se encuentra más avanzada dentro del conducto del parto o en su máxima proximidad. Se puede percibir a través del cuello uterino por tacto vaginal⁶².

- Presentación compuesta: Significa que un feto generalmente está posicionado con un brazo, mano, pie o pierna cerca de la parte del cuerpo más cercana a la abertura del canal de parto⁴³.
- Zona rural: Origen, principio de donde nace o se deriva algo⁶³.
- Recién nacido pretérmino: Se considera recién nacido pretérmino al bebé nacido entre las 28 y antes de las 37 semanas de gestación³⁶.
- Recién nacido a término: Se define como recién nacido a término aquel que nace entre las 37 y 41 semanas de gestación con un peso igual o superior a 2500 gramos³⁶.
- Recién nacido postérmino: Recién nacido postérmino aquel que nace con 42 semanas de gestación o más ³⁶.
- Sexo: El sexo corresponde al aspecto biológico de una persona según la Organización Mundial de la Salud se entiende como el conjunto de características biológicas y fisiológicas que diferencian a hombres y mujeres³⁶.

IV. METODOLOGÍA

4.1. Tipo y nivel de la investigación.

Enfoque.

Según Hernández esta investigación fue de enfoque cuantitativo, ya que se basa en métodos de recolección de datos más enfocados en la comunicación que en los procedimientos lógicos o estadísticos⁶⁴. Brindando información verídica sobre factores de riesgo asociados a desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de gineco – obstetricia del Hospital III - Essalud, Juliaca 2024.

Tipo.

Este estudio se enmarca dentro de un enfoque descriptivo-correlacional con un diseño retrospectivo observacional y de corte transversal se considera una investigación de tipo básica ya que su objetivo es ampliar el conocimiento sobre los factores relacionados con el desgarro perineal⁶⁴.

Nivel

La investigación es de nivel correlacional debido a que tiene la finalidad de conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos⁶⁴, variables en un contexto específico, de los factores de riesgo asociados al desgarro perineal en puérperas.

4.2. Diseño de Investigación

Este estudio se realizó bajo un diseño no experimental debido a que no se realizó una manipulación intencional de las variables, además se considera de tipo transversal ya que la recolección de datos se llevó a cabo en un único momento y en un solo tiempo⁶⁴.

M = Puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia en el Hospital III – Essalud en el periodo de enero a octubre del 2024.

V1 = Factores de riesgo

V2 = Desgarro perineal

R = Relación

4.3. Hipótesis general y específicas.

4.3.1. Hipótesis general

Existen factores de riesgo maternos, gineco-obstétricos y neonatales asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III - Essalud, Juliaca 2024.

4.3.2. Hipótesis específicas.

H.E.1:

El factor de riesgo materno se relaciona significativamente con el desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III - Essalud, Juliaca 2024.

H.E.2:

El factor de riesgo gineco- obstétrico se relaciona significativamente con el desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III - Essalud, Juliaca 2024.

H.E.3:

El factor de riesgo neonatales se relaciona significativamente con el desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III - Essalud, Juliaca 2024.

4.4. Identificación de las variables.

Variable 1: Factores de riesgo

Definición conceptual: Conjunto de factores personales sociales económicos y ambientales que determinan la condición de salud tanto a nivel individual como poblacional¹⁶.

• **Dimensiones:**

- ✓ Factores maternos.
- ✓ Factores gineco obstétricos.
- ✓ Factores neonatales.

Variable 2: Desgarro perineal

Definición conceptual: Daño en las partes blandas del canal vaginal, que se produce durante la expulsión de uno o más fetos y la placenta desde la cavidad uterina sin que haya una sección del perineo vaginal¹⁶

Dimensiones:

- ✓ Severidad

4.5. Matriz de operacionalización de variables

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEMS	ESCALA DE VALORES	NIVEL Y RANGOS	TIPO DE VARIABLE ESTADÍSTICA
Factor de riesgo	Factores maternos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Edad materna ✓ Grado de instrucción ✓ Estado civil ✓ Zona ✓ Anemia 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 14 -19 años ○ 20 – 34 años ○ 35 años a más ○ Superior ○ Secundaria ○ Primaria ○ Soltera ○ Conviviente ○ Casada ○ Urbana ○ Rural ○ Severa Hb: < 7.0 g/dl ○ Moderada Hb: 7.0 – 9.0 g/dl ○ Leve Hb: 10.0 – 10.9 g/dl 	Ordinal 3 - alto riesgo 2 - moderado riesgo 1 - bajo riesgo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Factor de riesgo alto Rango 43 al 63 ▪ Factor de riesgo moderado Rango 22 al 42 ▪ Factor de riesgo bajo Rango 1 al 21 	Cuantitativo

	Factores gineco-obstétricos	☒ ITU ☒ IMC ☒ Controles prenatales ☒ Psicoprofilaxis ☒ Paridad ☒ Periodo intergenésico ☒ Edad gestacional	☐ ITU alto ☐ ITU bajo ☐ No tiene ITU ☐ Obesidad ☐ Sobrepeso ☐ Normal ☐ Sin control prenatal ☐ ≤ 6 CPN ☐ > 6 CPN ☐ No realizó ☐ Si realizó ☐ Primípara: 1 parto ☐ Multípara: 2 a más ☐ Gran multípara ☐ Adecuado ☐ Periodo intergenésico corto			
--	-----------------------------	---	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inducción ✓ Periodo expulsivo prolongado ✓ Episiotomía ✓ Presentación fetal ✓ Presentación compuesta ✓ Sexo ✓ Peso al nacer ✓ Perímetro cefálico 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Periodo intergenésico largo ○ Postérmino o maduro ○ A termino ○ Prematuro ○ Si ○ No ○ No ○ Si ○ No se realizó ○ Se realizó ○ Occipitoanterior ○ Occipitoposterior ○ No ○ Si ○ Femenino ○ Masculino ○ ≥ 4.000 gr. 			
--	--	---	--	--	--	--

Desgarro perineal			<ul style="list-style-type: none"> ○ ≥ 2.500 gr. a 3.999 gr. ○ < 1.500 gr. a 2.999 gr. ○ ≥ 35 cm ○ ≤ 34 cm 			
	Severidad	✓ Tamaño de tejido afectado	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sin desgarro ➤ I grado ➤ II grado ➤ III grado ➤ IV grado 			

4.6. Población – Muestra

Población.

La población está constituida por 353 puérperas atendidas en el servicio de Gineco Obstetricia de Hospital III – Essalud, Juliaca, durante el periodo de enero a octubre del 2024 cuyo parto fueron registrados en las historias clínicas.

Criterios de inclusión

- ✓ Historias clínicas de gestantes que tuvieron parto vaginal

Criterios de exclusión

- ✓ Historia clínica incompletas, no legibles.
- ✓ Término de la gestación por Cesárea
- ✓ Excluir partos de gestantes con patologías.

Muestra.

La muestra es de tipo censal dado que se tomó el 100% de la población al ser un grupo de tamaño manejable en este contexto Ramírez (1997) señala que cuando se evalúa a toda la población corresponde a una muestra censal y que los parámetros poblacionales quedaban determinados. Por esta razón la población de estudio se define como censal ya que al mismo tiempo representa el universo la población y la muestra de la investigación⁶⁵. Nuestra muestra esta constituido por 353 puérperas de parto eutócico atendidas en el Servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital III Essalud, Juliaca en el periodo de enero a octubre del 2024.

Muestreo:

Muestreo no probabilístico por conveniencia.

4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de información.

Técnica

Se empleó la técnica de observación documental junto con la recopilación de información proveniente de historias clínicas y registros en los libros del centro obstétrico abarcando datos de la atención del parto tanto de puérperas con desgarro perineal como de aquellas que no lo presentaron en puérperas atendidas en el servicio de gineco obstetricia del Hospital III – Essalud, Juliaca 2024.

Instrumento

Para la recolección de información se emplearon fichas diseñadas específicamente para recopilar los datos esenciales que permitirán el análisis de las variables establecidas este instrumento está estructurado en dos secciones la primera corresponde a los datos de la variable I (factores maternos con 7 ítems, obstétricos con 10 ítems y neonatales con 3 ítems) y datos de las variables II (severidad de desgarro con 1 ítems) , La información fue extraída de las historias clínicas de cada puérpera y de los registros en los libros del centro obstétrico, el mismo instrumento se aplicó en ambos casos enfocándose en la documentación de puérperas con y sin desgarro perineal.

En este estudio el instrumento fue ajustado por las investigadoras y posteriormente sometido a un proceso de validación mediante juicio de expertos.

Validez del instrumento

Dado que la ficha de recolección de datos es un instrumento de recopilación y no de medición su validación se llevó a cabo mediante la evaluación por juicio de expertos.

4.8. Técnicas de análisis y procesamiento de datos.

Este proyecto fue sometido a la aprobación de nuestro asesor, así como parte administrativa de la universidad Autónoma de Ica, por lo siguiente, se solicitará la autorización del Hospital III Essalud Juliaca 2024, para la implementación del instrumento de este estudio, La información recopilada mediante la ficha de recolección de datos será procesada utilizando los programas Microsoft Excel y SPSS para su análisis posteriormente los resultados serán presentados en tablas que reflejen tanto la frecuencia absoluta como la relativa.

V. RESULTADOS

5.1. Presentación de Resultados

Tabla 1. Factores maternos en puérperas atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III – ESSALUD, Juliaca 2024

EDAD MATERNA	Frecuencia	Porcentaje
14 -19 años	7	2.0
20 – 34 años	264	74.8
35 años a más	82	23.2
Total	353	100.0
GRADO DE INSTRUCCIÓN	Frecuencia	Porcentaje
Superior	244	69.1
Secundaria	107	30.3
Primaria	2	0.6
Total	353	100.0
ESTADO CIVIL	Frecuencia	Porcentaje
Soltera	5	1.4
Conviviente	230	65.2
Casada	118	33.4
Total	353	100.0
ZONA	Frecuencia	Porcentaje
Urbana	245	69.4
Rural	108	30.6
Total	353	100.0
ANEMIA DURANTE EL EMBARAZO	Frecuencia	Porcentaje
Sin anemia	194	55.0
Leve Hb: 10.0 - 10.9 g/dl	84	23.8
Moderada Hb: 7.0 - 9.0 g/dl	68	19.3
Severa Hb: < 7.0 g/dl	7	2.0
Total	353	100.0
ITU DURANTE EL EMBARAZO	Frecuencia	Porcentaje
No presenta	184	52.1
Itu leve	114	32.3
Itu severa	55	15.6
Total	353	100.0
IMC	Frecuencia	Porcentaje
obesidad	44	12.5
Sobrepeso	116	32.9
Normal	169	47.9
Bajo peso	24	6.8
Total	353	100.0

Fuente: Instrumento aplicado por autores - 2024

Figura 1. Factores maternos en púerperas atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III – ESSALUD, Juliaca 2024

Tabla 2. Factores Gineco-Obstétricos en puérperas atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III – ESSALUD, Juliaca 2024

CONTROL PRENATAL	Frecuencia	Porcentaje
Sin control	6	1.7
<= 6 CPN	70	19.8
> 6 CPN	277	78.5
Total	353	100.0
PSICROFILAXIS	Frecuencia	Porcentaje
Si realizó	36	10.2
No realizó	317	89.8
Total	353	100.0
PARIDAD	Frecuencia	Porcentaje
Primípara	111	31.4
Múltipara	182	51.6
Gran múltipara	60	17.0
Total	353	100.0
PERIODO INTERGENÉSICO	Frecuencia	Porcentaje
Adecuado	173	49.0
Corto	120	34.0
Largo	60	17.0
Total	353	100.0
EDAD GESTACIONAL	Frecuencia	Porcentaje
Post término o Maduro	70	19.8
A término	266	75.4
Prematuro	17	4.8
Total	353	100.0
INDUCCIÓN	Frecuencia	Porcentaje
Si	59	16.7
No	294	83.3
Total	353	100.0
PERIODO EXPULSIVO PROLONGADO	Frecuencia	Porcentaje
No	351	99.4
Si	2	0.6
Total	353	100.0
EPISIOTOMÍA	Frecuencia	Porcentaje
Si se realizó	159	45.0
No se realizó	194	55.0
Total	353	100.0
PRESENTACIÓN FETAL	Frecuencia	Porcentaje
Occipitoanterior	344	97.5
Occipitoposterior	9	2.5
Total	353	100.0
PRESENTACIÓN COMPUESTA	Frecuencia	Porcentaje
No	320	90.7
Si	33	9.3
Total	353	100.0

Fuente: Instrumento aplicado por autores - 2024

Figura 2. Factores Gineco-Obstétricos en púerperas atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III – ESSALUD, Juliaca 2024

Tabla 3. Factores neonatales en puérperas atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III – ESSALUD, Juliaca 2024

SEXO	Frecuencia	Porcentaje
Femenino	179	50.7
Masculino	174	49.3
Total	353	100.0
PESO AL NACER	Frecuencia	Porcentaje
≥ 4.000 gr.	8	2.3
≥ 2.500 gr. a 3.999 gr.	340	96.3
< 1.500 gr.	5	1.4
Total	353	100.0
PERÍMETRO CEFÁLICO	Frecuencia	Porcentaje
≥ 35 cm	280	79.3
≤ 34 cm	73	20.7
Total	353	100.0

Fuente: Instrumento aplicado por autores - 2024

Figura 3. Factores neonatales en puérperas atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III – ESSALUD, Juliaca 2024

Tabla 4. Tipo de desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III - ESSALUD, Juliaca 2024

SEVERIDAD DE DESGARRO	Frecuencia	Porcentaje
Sin desgarro	189	53.5
Grado I	121	34.3
Grado II	43	12.2
Total	353	100.0

Fuente: Instrumento aplicado por autores – 2024

Figura 4. Tipo de desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III – ESSALUD, Juliaca 2024

Tabla 5. Factores maternos asociados al desgarro perineal a en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III – ESSALUD, Juliaca 2024

FACTORES MATERNO		DESGARRO PERINEAL							
		Sin desgarro		Grado I		Grado II		Total	
		f	%	f	%	f	%	f	%
EDAD MATERNA	14 -19 años de edad	2	28.6%	2	28.6%	3	42.9%	7	100%
	20 – 34 años de edad	154	58.3%	79	29.9%	31	11.7%	264	100%
	35 años a más	33	40.2%	40	48.8%	9	11.0%	82	100%
GRADO DE INSTRUCCIÓN	Superior	134	54.9%	0	33.2%	29	11.9%	244	100%
	Secundaria	54	50.5%	40	37.4%	13	12.1%	107	100%
	Primaria	1	50.0%	81	0.0%	1	50.0%	2	100%
ESTADO CIVIL	Soltera	1	20.0%	2	40.0%	2	40.0%	5	100%
	Conviviente	128	55.7%	74	32.2%	28	12.2%	230	100%
	Casada	60	50.8%	45	38.1%	13	11.0%	118	100%
ZONA	Urbano	129	52.7%	88	35.9%	28	11.4%	245	100%
	Rural	60	55.6%	33	30.6%	15	13.9%	108	100%
ANEMIA DURANTE EL EMBARAZO	Sin anemia	114	58.8%	66	34.0%	14	7.2%	194	100%
	Leve Hb: 10.0 - 10.9 g/dl	37	44.0%	32	38.1%	15	17.9%	84	100%
	Moderada Hb: 7.0 - 9.0 g/dl	38	55.9%	17	25.0%	13	19.1%	68	100%
	Severa Hb: < 7.0 g/dl	0	0.0%	6	85.7%	1	14.3%	7	100%
ITU DURANTE EL EMBARAZO	No tiene	116	63.0%	54	29.3%	14	7.61%	184	100%
	Bajo	51	44.7%	52	45.6%	11	9.6%	114	100%
	Alto	22	40.0%	15	27.3%	18	32.7%	55	100%
IMC	Obesidad	27	61.3%	12	27.3%	5	11.4%	44	100%
	Sobrepeso	52	44.8%	52	44.8%	12	10.3%	116	100%
	Normal	96	56.8%	51	30.8%	22	13.2%	169	100%
	Bajo peso	14	58.3%	6	25.0%	4	16.6%	24	100%

Fuente: Instrumento aplicado por autores – 2024.

Figura 5. Factores maternos asociados al desgarro perineal atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III – ESSALUD, Juliaca 2024

**Tabla 6. Factores gineco-obstétricos asociados al desgarro perineal
atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III –
ESSALUD, Juliaca 2024**

FACTORES GINECO-OBSTÉTRICO		DESGARRO PERINEAL							
		Sin desgarro		Grado I		Grado II		Total	
		f	%	f	%	f	%	f	%
CONTROL PRENATAL	Sin control	0	0.0%	4	66.7%	2	33.3%	6	100%
	<= 6	29	41.4%	29	41.4%	12	17.1%	70	100%
	> 6	160	57.8%	88	31.8%	29	10.5%	277	100%
PSICROFILAXIS	Si realizó	5	13.8%	22	61.1%	9	25.0%	36	100%
	No realizó	184	58.4%	99	31.2%	34	10.7%	317	100%
PARIDAD	Primípara	72	64.9%	27	24.3%	12	10.8%	111	100%
	Múltipara	92	50.5%	66	36.3%	24	13.2%	182	100%
	Gran múltipara	25	41.7%	28	46.7%	7	11.7%	60	100%
PERIODO INTERGENÉSICO	Adecuado	107	61.8%	48	27.7%	18	10.4%	173	100%
	Corto	49	40.8%	54	45.0%	17	14.1%	120	100%
	Largo	33	55.0%	19	31.6%	8	13.3%	60	100%
EDAD GESTACIONAL	Post término o maduro	41	58.6%	22	31.4%	7	10.0%	70	100%
	A término	137	51.5%	94	35.3%	35	13.2%	266	100%
	Prematuro	11	64.7%	5	29.4%	1	5.9%	17	100%
INDUCCIÓN	Si	20	33.9%	31	52.5%	8	13.5%	59	100%
	No	169	57.4%	90	30.6%	35	11.9%	294	100%
PERIODO EXPULSIVO PROLONGADO	No	188	53.6%	120	34.2%	43	12.3%	351	100%
	Si	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	100%
EPISIOTOMÍA	Si se realizó	132	83.2%	18	11.3%	9	5.6%	159	100%
	No se realizó	57	29.3%	103	53.9%	34	17.5%	194	100%
PRESENTACIÓN FETAL	Occipitoanterior	180	52.3%	121	35.2%	43	12.5%	344	100%
	Occipitoposterior	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	100%
PRESENTACIÓN COMPUESTA	No	176	55.0%	109	34.1%	35	10.9%	320	100%
	Si	13	39.4%	12	36.4%	8	24.2%	33	100%

Fuente: Cuestionario aplicado por los autores

Figura 6. Factores gineco-obstétricos asociados al desgarro perineal atendidas el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III – ESSALUD, Juliaca 2024

Tabla 7. Factores neonatales asociados al desgarro perineal atendidas el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III – ESSALUD, Juliaca 2024.

FACTORES NEONATALES		DESGARRO PERINEAL							
		Sin desgarro		Grado I		Grado II		Total	
		f	%	f	%	f	%	f	%
SEXO	Femenino	94	52.5%	65	36.3%	20	11.2%	179	100%
	Masculino	95	54.6%	56	32.2%	23	13.2%	174	100%
PESO AL NACER	≥ 4.000 gr.	7	87.5%	1	2.5%	0	0.0%	8	100%
	≥ 2.500 gr.								
	a 3.999 gr.	181	53.2%	117	34.4%	42	12.3%	340	100%
	1.500 a 2.499 gr.	1	20.0%	3	60.0%	1	20.0%	5	100%
PERIMETRO CEFALICO	≥ 35 cm	158	56.4%	95	33.9%	27	9.6%	280	100.0%
	≤ 34 cm	31	0.0%	28	35.6%	16	21.9%	73	100.0%

Fuente: Instrumento aplicado por autores – 2024

Figura 7. Factores neonatales asociados al desgarro perineal atendidas el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III – ESSALUD, Juliaca 2024.

5.2. Interpretación de resultados

- En la tabla y gráfico 01, se observa los factores maternos de las puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud, Juliaca. Se observa que el 74.79%(264) de las mujeres tienen una edad entre 20 y 34 años. El 23.23%(82) son mayores de 34 años, y el 1.98%(7) tienen edades entre 14 a 19 años. En cuanto al grado de instrucción el 69.12%(244) de las madres tiene tienen grado de instrucción superior, el 30.30%(107) tienen estudios a nivel secundario y el 0.57%(2) de las madres tienen el grado de instrucción primaria. Respecto al estado civil, el 65.16%(230) son convivientes, el 22.43%(118) están casados y solo el 1.42%(5) son solteras. En cuanto al lugar de procedencia 69.41%(245) provienen de áreas urbanas y el 30.59%(108) de áreas rurales. Respecto a la anemia durante el embarazo el 54.96%(194) no presenta anemia, el 23.80%(84) tiene anemia leve, el 19.26%(68) presenta anemia moderada y solo el 1.98%(7) tiene anemia severa. En relación a las infecciones del tracto urinario (ITU) el 52.12%(184) no presenta ITU, y el 32.29%(114) tiene ITU bajo y el 15%(55) presenta ITU alto. Finalmente, en cuanto al Índice de Masa Corporal (IMC), el 47.88%(169) tiene un peso normal, el 32.86%(116) presenta sobrepeso y el 12.46%(44) son obesos y 6.80%(24) tienen un peso bajo.
- En la tabla y gráfico 02, se presenta los factores Gineco – Obstétricos de las puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud, Juliaca, Se observa que el 78.47%(227) realizó más de 6 controles prenatales (CPN), el 19.83%(70) realizo 6 o menos controles y solo el 1.70(6) no recibió control prenatal. En cuanto a la Psicoprofilaxis el 63.17(223) no la realizó, el 35.41(125) si se realizó y el 1.42%(5) si realizó por emergencia. En relación a la paridad, el 51.56%(182) son múltipara, el 31.44%(111) son primíparas, y el 17.00%(60) son gran múltipara.

Respecto al periodo de intergenésico el 49.14%(173) tienen un periodo adecuados, el 33.43%(118) tienen un periodo corto y el 17.56%(62) tiene un periodo largo. Con respecto a la edad gestacional el 97.5%(159) llegó a término y el 2.5%(4) fueron prematuros. En cuanto a la inducción, el 83.00%(293) no recibió inducción, mientras que el 17.00%(60) si recibió inducción. En relación al periodo expulsivo prolongado el 99.43%(351) no presentó este problema, mientras que solo el 0.59%(2) lo presentó. En cuanto a la episiotomía el 53.26%(188) no la recibió, el 46.74%(165) si la recibió. En lo que respecta a la presentación fetal, el 97.45%(344) fue occipitoanterior, el 2.55%(9) fue occipitoposterior. Finalmente, en relación a la presentación compuesta, el 90.65%(320) no la presentó mientras que el 9.35%(33) si la presentó.

- En la tabla y gráfico 03 se muestra los factores neonatales de los recién nacidos atendidos en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud, Juliaca, Se observa que el 50.71%(179) son de sexo femenino y el 49.29%(174) son de sexo masculino. En cuanto al peso al nacer, el 97.17%(343) tienen un peso entre ≥ 2.500 gr. a 3.999 gramos y el 2.83%(10) tiene un peso entre < 1.500 gr. a 2.499 gramos. Respecto al perímetro cefálico el 79.3%(280) presentan un perímetro igual o menor a 34 cm. Y el 20.7%(73) tienen un perímetro igual o mayor a 35 cm.
- En la tabla y gráfico 04. Se muestra el tipo de desgarro perineal en las puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud, Juliaca, Se observa que las madres no tienen desgarro el 53.54%(189), el grado I se presenta en 34.28%(121) de los casos, mientras que el grado II se presenta en el 12.18%(43).
- En la tabla y gráfico 05 se evidencia la relación entre los factores maternos y los desgarros perineales en puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud, Juliaca 2024. Se encontró que en la edad materna las puérperas de 14 a

19 años no tuvieron desgarro 28.6% (2), y el 28.6 % (2) tuvieron desgarro de grado I, el 42.9 % (3) tuvieron desgarro grado II, las puérperas de 20 a 34 años no tuvieron desgarro 58.3 % (154), y el 29.9 % (79) tuvieron desgarro grado I, el 11.7 % (31) tuvieron desgarro grado II, las puérperas de 35 años a mas no tuvieron desgarro 40.2 % (33), y el 48.8 % (40) tuvieron desgarro grado I, el 11.0 % (9) tuvieron desgarro grado II, con respecto a grado de instrucción en nivel superior no tuvieron desgarro 54.9 % (134), y el 33.2 % (0) tuvieron desgarro de grado I, el 11.9 % (9) tuvieron desgarro grado II, secundaria no tuvieron desgarro 50.5 % (54), y el 37.4 % (40) tuvieron desgarro grado I, el 12.1 % (13) tuvieron desgarro grado II, primaria no tuvieron desgarro 50.0 % (1), y el 0.0 % (81) tuvieron desgarro grado I, el 50.0 % (1) tuvieron desgarro grado II, respecto a estado civil las puérperas solteras no tuvieron desgarro 20.0 % (1), y el 40.0 % (2) tuvieron desgarro grado I, el 40.0 % (2) tuvieron desgarro grado II, conviviente no tuvieron desgarro 55.7 % (128), y el 32.2 % (74) tuvieron desgarro grado I, el 12.2 % (28) tuvieron desgarro grado II, casadas no tuvieron desgarro 50.8 % (60), y el 38.1 % (45) tuvieron desgarro grado I, el 11.0 % (13) tuvieron desgarro grado II. Así mismo en zona las puérperas que radican en zona urbana no tuvieron desgarro 52.7 % (129), y el 35.9 % (88) tuvieron desgarro grado I, el 11.4 % (28) tuvieron desgarro grado II, las que radican en zona rural no tuvieron desgarro 55.6 % (60), y el 30.6 % (33) tuvieron desgarro grado I, el 13.9 % (15) tuvieron desgarro grado II, en cuanto a las puérperas con anemia en el embarazo , sin anemia no tuvieron desgarro 58.8 % (114), y el 34.0 % (66) tuvieron desgarro grado I, el 7.2 % (14) tuvieron desgarro grado II, leve Hb: 10.0 a 10.9 g/dl no tuvieron desgarro 44.0 % (37), y el 38.1 % (32) tuvieron desgarro grado I, el 17.9 % (15) tuvieron desgarro grado II, moderada Hb: 7.0 a 9.0 g/dl no tuvieron desgarro 55.9 % (38), y el 25.0 % (17) tuvieron desgarro grado I, el 19.1 % (13) tuvieron desgarro grado II, severa Hb: < 7.8 g/dl no tuvieron desgarro 0.0 % (0), y el 85.7 % (6) tuvieron desgarro

grado I, el 14.3 % (1) tuvieron desgarro grado II, Itu durante el embarazo las puérperas que no tuvieron itu ni desgarro 63.0 % (116), y el 29.3 % (54) tuvieron desgarro grado I, el 7.61 % (14) tuvieron desgarro grado II, Itu bajo no tuvieron desgarro 44.7 % (51), y el 45.6 % (52) tuvieron desgarro grado I, el 9.6 % (11) tuvieron desgarro grado II, Itu alto no tuvieron desgarro 40.0 % (22), y el 27.3 % (15) tuvieron desgarro grado I, el 32.7 % (18) tuvieron desgarro grado II, IMC las gestantes con obesidad no tuvieron desgarro 61.3 % (27), y el 27.3 % (12) tuvieron desgarro grado I, el 11.4 % (5) tuvieron desgarro grado II, gestantes con sobrepeso no tuvieron desgarro 44.8 % (52), y el 44.8 % (52) tuvieron desgarro grado I, el 10.3 % (12) tuvieron desgarro grado II, peso normal no tuvieron desgarro 56.8 % (96), y el 30.8 % (51) tuvieron desgarro grado I, el 13.2 % (22) tuvieron desgarro grado II, bajo peso no tuvieron desgarro 58.3 % (14), y el 25.0 % (6) tuvieron desgarro grado I, el 16.6 % (4) tuvieron desgarro grado II.

- En la tabla y grafico 06 se evidencia la relación entre los factores gineco – obstétricos y los desgarros perineales en puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud, Juliaca 2024. Se encontró que el en control prenatal las puérperas sin controles no tuvieron desgarro 0.0 % (0), y el 66.7 % (4) tuvieron desgarro de grado I, el 33.3 % (2) tuvieron desgarro grado II, ≤ 6 CPN no tuvieron desgarro 41.4 % (29), y el 41.4 % (29) tuvieron desgarro grado I, el 17.1 % (12) tuvieron desgarro grado II, > de 6 CPN no tuvieron desgarro 57.8 % (160), y el 31.8 % (88) tuvieron desgarro grado I, el 10.5 % (29) tuvieron desgarro grado II, con respecto a psicoprofilaxis, las que si realizaron no tuvieron desgarro 13.8 % (5), y el 61.1 % (22) tuvieron desgarro de grado I, el 25.0 % (9) tuvieron desgarro grado II, las que no realizaron no tuvieron desgarro 58.4 % (184), y el 31.2 % (99) tuvieron desgarro grado I, el 10.7 % (34) tuvieron desgarro grado II, Así mismo paridad las primíparas no tuvieron desgarro 64.9 % (72), y el 24.3 % (27)

tuvieron desgarro grado I, el 10.8 % (12) tuvieron desgarro grado II, múltipara no tuvieron desgarro 50.5 % (92), y el 63.3 % (66) tuvieron desgarro grado I, el 13.2 % (24) tuvieron desgarro grado II, gran múltipara no tuvieron desgarro 41.7 % (25), y el 46.7 % (28) tuvieron desgarro grado I, el 11.7 % (7) tuvieron desgarro grado II, en cuanto a las periodo intergenésico, la puérperas con periodo adecuado no tuvieron desgarro 61.8 % (107), y el 27.7 % (48) tuvieron desgarro grado I, el 10.4 % (18) tuvieron desgarro grado II, corto no tuvieron desgarro 40.8 % (49), y el 45.0 % (52) tuvieron desgarro grado I, el 14.1 % (17) tuvieron desgarro grado II, largo no tuvieron desgarro 55.0 % (33), y el 31.6 % (19) tuvieron desgarro grado I, el 13.3 % (8) tuvieron desgarro grado II, a si mismo edad gestacional, postérmino o maduro no tuvieron desgarro 58.6 % (41), y el 31.4 % (22) tuvieron desgarro grado I, el 10.0 % (7) tuvieron desgarro grado II, a termino no tuvieron desgarro 51.5 % (137), y el 35.3 % (94) tuvieron desgarro grado I, el 13.2 % (35) tuvieron desgarro grado II, prematuro no tuvieron desgarro 64.7 % (11), y el 29.4 % (5) tuvieron desgarro grado I, el 5.9 % (1) tuvieron desgarro grado II, por lo tanto en inducción; las que si tuvieron inducción no tuvieron desgarro 33.9 % (20), y el 52.5 % (31) tuvieron desgarro grado I, el 13.5 % (8) tuvieron desgarro grado II, las que no tuvieron induccion no tuvieron desgarro 57.4 % (169), y el 30.6 % (90) tuvieron desgarro grado I, el 11.9 % (35) tuvieron desgarro grado II, en cuanto a periodo expulsivo prolongado; las que no presentaron no tuvieron desgarro 53.6 % (188), y el 34.2 % (120) tuvieron desgarro grado I, el 12.3 % (43) tuvieron desgarro grado II, las que si presentaron no tuvieron desgarro 50.0 % (1), y el 50.0 % (1) tuvieron desgarro grado I, el 0.0 % (0) tuvieron desgarro grado II. En episiotomía a las que le realizaon no tuvieron desgarro 83.2 % (132), y el 11.3 % (18) tuvieron desgarro grado I, el 5.6 % (9) tuvieron desgarro grado II, por lo que en presentación fetal en occipitoanterior no tuvieron desgarro 52.3 % (180), y el 35.2 % (121) tuvieron desgarro grado I, el 12.5 % (43) tuvieron desgarro grado II, occipitoposterior no tuvieron

desgarro 100.0 % (9), y el 0.0 % (0) tuvieron desgarro grado I, el 0.0 % (0) tuvieron desgarro grado II, en presentación compuesta las que no presentaron no tuvieron desgarro 55.0 % (176), y el 34.1 % (109) tuvieron desgarro grado I, el 10.9 % (35) tuvieron desgarro grado II, las que si presentaron no tuvieron desgarro 39.4 % (13), y el 36.4 % (12) tuvieron desgarro grado I, el 24.2 % (8) tuvieron desgarro grado II.

- En la tabla y grafico 07 se evidencia la relación entre los factores neonatales y los desgarros perineales en puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud, Juliaca 2024. Se encontró que en sexo, femenino no tuvieron desgarro 52.5 % (94), y el 36.3 % (65) tuvieron desgarro de grado I, el 11.2 % (20) tuvieron desgarro grado II, masculino no tuvieron desgarro 54.6 % (95), y el 32.2 % (56) tuvieron desgarro grado I, el 11.2 % (20) tuvieron desgarro grado II, con respecto a peso al nacer , ≥ 4.000 gr. no tuvieron desgarro 87.5 % (7), y el 2.5 % (1) tuvieron desgarro de grado I, el 0.0 % (0) tuvieron desgarro grado II, ≥ 2.500 gr a 3.999 gr. no tuvieron desgarro 53.2 % (181), y el 34.4 % (117) tuvieron desgarro grado I, el 12.3 % (42) tuvieron desgarro grado II, 1.500 gr. a 2.499 gr. no tuvieron desgarro 20.0 % (1), y el 60.0 % (3) tuvieron desgarro grado I, el 20.0 % (1) tuvieron desgarro grado II, así mismo perímetro cefalico, ≥ 35 cm. no tuvieron desgarro 56.4 % (158), y el 33.9 % (95) tuvieron desgarro grado I, el 9.6 % (27) tuvieron desgarro grado II, $\leq$ a 34 cm. no tuvieron desgarro 0.0 % (31), y el 35.6 % (28) tuvieron desgarro grado I, el 21.9 % (16) tuvieron desgarro grado II.

VI. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

6.1. Análisis inferencial.

Ho. La distribución de datos es normal sig = p valor > 0.05

Ha: La distribución de datos no es normal. sig = p valor < 0.05

Tabla 8. Prueba de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Estadístico	gl	Sig.
Edad materna	,447	353	,000
Grado de instrucción	,436	353	,000
Estado civil	,406	353	,000
Zona	,440	353	,000
Anemia durante el embarazo	,339	353	,000
Itu durante el embarazo	,326	353	,000
IMC	,285	353	,000
Control Prenatal	,477	353	,000
Psicoprofilaxis	,530	353	,000
Paridad	,269	353	,000
Periodo Intergenésico	,308	353	,000
Edad Gestacional	,426	353	,000
Inducción	,506	353	,000
Periodo expulsivo Prolongado	,524	353	,000
Episiotomía	,367	353	,000
Presentación Fetal	,539	353	,000
Presentación Compuesta	,532	353	,000
Sexo	,345	353	,000
Peso al nacer	,495	353	,000
Perímetro cefálico	,430	353	,000
Severidad de desgarro	,335	353	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

En conformidad con la tabla 8, mediante la prueba de normalidad se obtuvieron valores < 0.005 , lo que señala una distribución no adecuada de los datos por ende corresponde no escoger un estadístico paramétrico para el análisis diferencial.

HIPOTESIS GENERAL

Ho: No existe relación significativa entre factores maternos, gineco – obstétricos y neonatales de desgarros perineales en puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud Juliaca 2024

Ha: Existe relación significativa entre factores maternos, gineco – obstétricos y neonatales de desgarros perineales en puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud Juliaca 2024

CONSTATAION DE HIPOTESIS ESPECIFCA

HIPOTESIS ESPECIFICA 1:

Ho: No existe relación significativa entre factores maternos y desgarros perineales en puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud Juliaca 2024

Ha: Existe relación significativa entre factores maternos y desgarros perineales en puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud Juliaca 2024

Tabla 9. Relación mediante Chi – cuadrado entre factores maternos y desgarros perineales en puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud Juliaca 2024

FACTORES MATERNOS		Pruebas de chi-cuadrado		
		Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Edad materna	Chi-cuadrado de Pearson	16,760 ^a	4	0.002
Grado de instrucción	Chi-cuadrado de Pearson	3,716 ^a	4	0.446
Estado civil	Chi-cuadrado de Pearson	5,567 ^a	4	0.234
Zona	Chi-cuadrado de Pearson	1,119 ^a	2	0.571
Anemia durante el embarazo	Chi-cuadrado de Pearson	22,549 ^a	6	0.001
ITU durante el embarazo	Chi-cuadrado de Pearson	35,821 ^a	4	0.000
IMC	Chi-cuadrado de Pearson	9,254 ^a	6	0.160

En la Tabla 9. Se observa que dentro de los factores maternos asociados al desgarro perineal atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud, tenemos que todos los factores no influyen en el desgarro perineal con una significancia de $p > 0,05$. Excepto edad materna, anemia e ITU.

HIPOTESIS ESPECIFICA 2:

Ho: No existe relación significativa entre factores Gineco – Obstétricos y desgarros perineales en puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud Juliaca 2024.

Ha: Existe relación significativa entre factores Gineco – Obstétricos y desgarros perineales en puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud Juliaca 2024.

Tabla 10. Relación mediante Chi – cuadrado entre factores Gineco – Obstétricos y desgarros perineales en puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud Juliaca 2024

FACTORES GINECO - OBSTETRICOS	Pruebas de chi-cuadrado			
		Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Control prenatal	Chi-cuadrado de Pearson	13,726 ^a	4	0.008
Psicoprofilaxis	Chi-cuadrado de Pearson	25,601 ^a	2	0.000
Paridad	Chi-cuadrado de Pearson	10,982 ^a	4	0.027
Periodo intergenésico	Chi-cuadrado de Pearson	13,073 ^a	4	0.011
Edad gestacional	Chi-cuadrado de Pearson	2,339 ^a	4	0.674
Inducción	Chi-cuadrado de Pearson	12,110 ^a	2	0.002
Periodo expulsivo prolongado	Chi-cuadrado de Pearson	,395 ^a	2	0.821
Episiotomía	Chi-cuadrado de Pearson	101,535 ^a	2	0.000
Presentación fetal	Chi-cuadrado de Pearson	8,014 ^a	2	0.018
Presentación compuesta	Chi-cuadrado de Pearson	5,754 ^a	2	0.056

En la Tabla 10. Se observa que dentro de los factores gineco- obstétricos asociados al desgarro perineal atendidas en el servicio de gineco – obstetricia del Hospital III – Essalud tenemos que todos los factores no influyen en el desgarro perineal con una significancia de $p > 0,05$. Excepto

control prenatal, Psicoprofilaxis, paridad, periodo intergenésico, inducción, episiotomía y presentación fetal.

HIPOTESIS ESPECIFICA 3:

Ho: No existe relación significativa entre factores neonatales y desgarros perineales en puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud Juliaca 2024

Ha: Existe relación significativa entre factores neonatales y desgarros perineales en puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud Juliaca 2024

Tabla 11. Relación mediante Chi – cuadrado entre factores neonatales y desgarros perineales en puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud Juliaca 2024

FACTORES MATERNOS	Pruebas de chi-cuadrado			
		Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Peso al nacer	Chi-cuadrado de Pearson	6,087 ^a	4	0.193
Perímetro cefálico	Chi-cuadrado de Pearson	9,319 ^a	2	0.009
Sexo	Chi-cuadrado de Pearson	,813 ^a	2	0.666

En la Tabla 11. Se observa que dentro de los factores neonatales asociados al desgarro perineal atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital III – Essalud, tenemos que todos los factores no influyen en el desgarro perineal con una significancia de $p > 0,05$. Excepto perímetro cefálico.

VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

7.1. Comparación de resultados.

Dentro de los factores maternos, el predictor fue edad materna, anemia e Itu, lo que se encontró en asociación con el desgarro perineal con una significancia $p < 0.05$, estos resultados fueron similares al estudio realizado por Abedzadeh M, Talebian A, Sadat Z, Mesdaghinia E. en sus resultados menciona que el factor asociado fue la edad materna que presentaron trauma perineal¹¹. Así mismo en el estudio de Beretta V⁴. en sus resultados menciona como factor asociado a desgarro perineal con la edad materna avanzada, sin embargo, se contrapone a lo encontrado por Gonzales M¹⁶. en su estudio realizado no encontró la edad materna avanzada que tenga significancia en los desgarros perineales Rojas R, también se contrapone a lo encontrado, mientras que nuestros resultados si tienen relación con la literatura existente respecto a algunos predictores de Itu: es la segunda patología más frecuente en gestantes y un factor de riesgo significativo para desgarro perineal²⁹, y anemia: La anemia es un factor de riesgo de gran importancia, ya que este incrementa la posibilidad de que la gestante presente múltiples enfermedades y complicaciones durante su gestación, parto y puerperio²⁷, según la teoría de los condicionantes de la salud, estos factores pueden actuar de manera positiva o negativa sobre la salud.

Dentro de los factores Gineco – Obstétricos los predictores fueron control prenatal, psicoprofilaxis, paridad, periodo intergenésico, inducción y presentación fetal, se encontró una asociación con el desgarro perineal en púerperas con una significancia $p < 0.005$, estos resultados fueron similares según Herrera D., Pillajo D¹⁴ en sus resultados menciona que el factor

asociado fue la paridad, igual que Beretta V⁴. Abedzadeh M, Talebian A, Sadat Z, Mesdaghinia E¹¹, en su estudio demostraba que había significancia entre los desgarros perineales y la inducción del parto. Rojas R¹⁷. encontró nivel de significancia en periodo intergenésico, sin embargo, se contraponen lo encontrado Gonzales M¹⁶. En su estudio realizado no encontró relación entre control prenatal, paridad, periodo intergenésico, inducción y presentación fetal con desgarros perineales, mientras que nuestros resultados sí tienen relación con la literatura existente respecto a algunos predictores, según la teoría de Rothman se basa en relaciones multicausales y define como causa cualquier evento, condición o característica esencial para generar un efecto.

Dentro de los factores neonatales, el predictor perímetro cefálico tiene un nivel de significancia $p < 0.005$ este resultado fue similar a Markus H, Karin F, Ayako H, Gunilla T, Hedda D, Kerstin N, encontraron que el perímetro cefálico estaba asociado a un mayor riesgo de desgarros perineales¹², Laurita V¹³. y Carmenes D¹⁵, Zapata M, indican que hubo más incidencia de desgarro por la circunferencia de la cabeza del bebé.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Se determino que los factores maternos, gineco – obstétricos y neonatales están asociados significativamente a los desgarros perineales en puérperas atendidas en el servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital III - ESSALUD, Juliaca 2024

Los factores de riesgo maternos que tuvieron asociación con el desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco Obstetricia del Hospital III – Essalud, Juliaca, fueron la edad materna (p valor < 0.002), anemia (p valor de < 0.001), ITU (p valor de < 0.000)

Los factores de riesgo Gineco – Obstétricos que tuvieron asociación con el desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco Obstetricia del Hospital III – Essalud, Juliaca, fueron controles prenatales (p valor de < 0.008), periodo intergenésico (p valor de < 0.006), inducción (p valor de < 0.004), episiotomía (p valor de < 0.000).

Los factores de riesgo neonatales tuvieron asociación con el desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco Obstetricia del Hospital III – Essalud, Juliaca, la cual fue perímetro cefálico (p valor < 0.000).

RECOMENDACIONES

Al servicio de Gineco Obstetricia se recomienda identificar desde el inicio los factores de riesgo asociados al desgarro perineal tanto maternos Gineco obstétricos y neonatales para la prevención de desgarro perineal.

Al servicio de periferie MAIS del Hospital III – Essalud Se recomienda mayor énfasis en la atención preconcepcional y prenatal para identificar los factores de riesgo; de esta manera puedan ser modificables y ser controlados en el momento, y Cumplir lo establecido en las normas, para lograr que cada gestante reciba como mínimo 6 controles prenatales, de las cuales por lo menos la primera y segunda atención debe de ser realizado por un profesional medico Gineco obstetra

Se recomienda al personal de salud realizar un dosaje de hemoglobina en su primer control prenatal y si tuviera anemia referir al especialista y hacer seguimiento en su mejora de ser necesario trabajar en coordinación con el equipo multidisciplinario al igual que como parte de la atención prenatal de rutina, todas las embarazadas deben someterse a pruebas de detección de bacteriuria asintomática en una consulta prenatal temprana. Las pruebas para detectar bacteriuria asintomática deben realizarse con un urocultivo, así mismo concientizar a la población que la edad materna avanzada tiene mayores complicaciones en el embrazo

Se recomienda al personal de salud mantenerse en constante capacitación sobre los protocolos de atención de parto haciendo énfasis en la técnica de protección del periné, con el propósito de reducir el desgarro perineal durante el parto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Muñoz de la Torre RJ, Mendoza Vilcahuaman J, Jauregui Sueldo JC, Toral Santillán EJ, Villanueva Navarro KY, Quispe Aroni R, et al. Desgarro perineal posparto y variables obstétricas y sociodemográficas en mujeres peruanas altoandinas. *MediSur*. junio de 2022;20(3):402-8.
2. Juárez Tabares JC, Chávez Loranca MDLÁ, Rodríguez Ayala C, González Aldeco PM, Arvizu Armenta JA, Woog Castañón A. Factores de riesgo maternos y neonatales para desgarro perineal severo. *Acta Médica Grupo Ángeles*. 2021;19(2):204-7.
3. Lopes GA, Leister N, Riesco MLG. Perineal care and outcomes in a birth center. *Texto Contexto - Enferm*. 4 de noviembre de 2019;28:e20190168.
4. Beretaa Martinez VI. Factores maternos, obstétricos y neonatales asociados a desgarros perineales en puérperas atendidas en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Repos URP [Internet]. Disponible en: https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14138/1730/BM_ARTINEZVALYA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5. Okeahialam NA, Sultan AH, Thakar R. The prevention of perineal trauma during vaginal birth. *Am J Obstet Gynecol*. marzo de 2024;230(3S):S991-1004.
6. Chamorro Martines G, Torre Romero J. Prevención Y Complicaciones De Episiotomía En Gestantes Primigestas. Hospital Carlos Andrade Marín, 2021. 2022.
7. Quispe Perez MI. Asociación entre Factores de Riesgo y Desgarro Perineal en pacientes atendidas en el Centro de Salud José Antonio Encinas Puno 2018. 2018.
8. Inducción en la Investigación: Justificación De La Investigación [Internet]. Inducción en la Investigación. [citado 29 de octubre de 2024]. Disponible en:

<https://florfanysantacruz.blogspot.com/2015/09/justificacion-de-la-investigacion.html>

9. Frank L.J. Visseren, François Mach, Yvo M. Smulders, David Carballo, Konstantinos C. Koskinas, Maria Bäck, et al. Guía ESC 2021 sobre la prevención de la enfermedad en la práctica clínica. *Rev Esp Cardiol*. 1 de mayo de 2022;75(5):429.e1-429.e104.
10. Casquino Ttira JE. Factores asociados a desgarros perineales en púerperas atendidas en un Hospital nivel II - 1 de Lima [Internet]. 2020 [citado 7 de noviembre de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.upeu.edu.pe/server/api/core/bitstreams/249f1786-87ed-4103-a7e0-53ccdf5387f9/content>
11. Abedzadeh K M, Talebian A, Sadat Z, Mesdaghinia E. Perineal trauma: incidence and its risk factors. *J Obstet Gynaecol J Inst Obstet Gynaecol*. febrero de 2019;39(2):206-11.
12. Jansson MH, Franzén K, Hiyoshi A, Tegerstedt G, Dahlgren H, Nilsson K. Risk factors for perineal and vaginal tears in primiparous women – the prospective POPRACT-cohort study. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2 de diciembre de 2020;20(1):749.
13. Laurita Longo V, Odjidja EN, Zanfini BA, Catarci S, Carducci B, Draisci G, et al. Risk factors associated with severe perineal lacerations during vaginal delivery: a 10-year propensity score–matched observational study. *AJOG Glob Rep*. 1 de mayo de 2023;3(2):100174.
14. Herrera Olivarez DG, Pillajo Flores DG. “Factores asociados a desgarros perineales en mujeres hospitalizadas por parto cefalovaginal en el periodo enero a julio del 2018 en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital Carlos Andrade Marín”. 2018 [citado 21 de febrero de 2025]; Disponible en: <http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2971035>

15. Carmenes Tavera DA, Zapata Luna MA. Factores maternos y obstétricos asociados al desgarro perineal en puérperas de parto vaginal en un hospital de Paita. Repos Inst - UCV [Internet]. 2023 [citado 18 de octubre de 2024]; Disponible en: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/131493>
16. Gonzales M. luis F. Factores de riesgo asociados a desgarro perineal severo en Hospital de Emergencias Villa El Salvador [Internet]. 2024 [citado 18 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/item/eeadb22f-2392-4ff4-a5a7-15ebc1d5067e>
17. Rojas Evangelista R. Factores de riesgos asociados a desgarro perineal en partos eutócicos atendidos en el centro de salud materno infantil Santa Anita, 2020 [Internet]. 2021 [citado 21 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.upsjb.edu.pe/item/71af73e3-5e37-47f8-983a-8be51bf47236>
18. Ent Argentina. Hábitos saludables, factores de riesgo y enfermedades no transmisibles [Internet]. Argentina.gob.ar. 2022 [citado 24 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/salud/habitos-saludables>
19. Samhsa. Risk and Protective Factors [Internet]. Risk and Protective Factors. 2020 [citado 24 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.samhsa.gov/sites/default/files/20190718-samhsa-risk-protective-factors.pdf>
20. Pita Fernández S, Vila Alonso M, Carpena Montero J. Determinación de factores de riesgo. Fistera, Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (España). 2002.
21. Álvarez C LS. Los determinantes sociales de la salud: más allá de los factores de riesgo [Internet]. 2025 [citado 18 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/545/54514009005.pdf>

22. Paz Prado FE. Factores de riesgo asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en centro obstétrico del Hospital Santa María del Socorro [Internet]. 2021 [citado 22 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.unica.edu.pe/server/api/core/bitstreams/3bf7ac77-8f88-471e-956a-eead7ceb598e/content>
23. Flores Retuerto RS. Factores de riesgo asociados a desgarros perineales en gestantes atendidas en el centro obstétrico del instituto nacional materno perinatal en el periodo de octubre – diciembre del 2018. Univ Nac Federico Villarreal [Internet]. 2019 [citado 18 de febrero de 2025]; Disponible en: <https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/2977>
24. Azterlanen A, Judirikoaren Z. Definiciones utilizadas en el censo del mercado de trabajo definiciones relativas a individuos [Internet]. 2002 [citado 20 de febrero de 2025]. Disponible en: https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/cmt_2002/es_cmt_2002/adjuntos/CMTOferta2002Doc.4.Definiciones.pdf
25. Conceptos Jurídicos. Estado civil: definición, clasificación e inscripción [Internet]. Conceptos Jurídicos. 2021 [citado 20 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://www.conceptosjuridicos.com/pe/estado-civil/>
26. Centro Nacional de planiamiento Estrategico. Integracion urbana - rural para el desarrollo sostenible en el Perú [Internet]. [citado 20 de febrero de 2025]. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4389919/DNPE%20Integracion%20urbano-rural_050423.pdf
27. Verde Pando M. Factores asociados a desgarros perineales en puérperas atendidas en el Centro de Salud Paucartambo, Cerro De Pasco 2021 - 2022. Univ Nac Daniel Alcides Carrión [Internet]. 5 de febrero de 2024 [citado 19 de febrero de 2025]; Disponible en: <http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3945>

28. Ramos Mendoza KS, Requena Arana TP. Factores de riesgos maternos asociados a desgarros perineales en gestantes atendidas en el Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia - Huancavelica 2018. 20 de mayo de 2019 [citado 20 de febrero de 2025]; Disponible en: <http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2562>
29. Mera Lojano LD, Mejía Contreras LA, Cajas Velásquez SM, Guarderas Muñoz SJ. Prevalencia y factores de riesgo de infección del tracto urinario en embarazadas. Rev Médica Inst Mex Seguro Soc. 2023;61(5):590-6.
30. Stachowiak A. Infección del tracto urinario: información general - Infección del tracto urinario - Enfermedades de los riñones y las vías urinarias - Enfermedades - Medicina Interna Basada en la Evidencia [Internet]. 2024 [citado 8 de noviembre de 2024]. Disponible en: <https://empendium.com/manualmibe/compendio/chapter/B34.II.14.8.1>.
31. Megías Patón C, Prado Ruiz JL, Rodríguez R, Sánchez J. El IMC durante el embarazo y su relación con el peso del recién nacido [Internet]. 2018 [citado 20 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://www.jonnpr.com/pdf/2173.pdf>
32. Velasquez Castro NL. Factores asociados a desgarros perineales durante el periodo expulsivo en el hospital Víctor Ramos Guardia, 2020 [Internet]. 2022. Disponible en: <http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/5242>
33. Beretta Martinez VI. Factores maternos, obstétricos y neonatales asociados a desgarros perineales en puérperas atendidas en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales durante el periodo de Enero a Julio del 2018. 2019 [citado 18 de febrero de 2025]; Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.14138/1730>
34. Carbajal C. J. Manual de Obstetricia y Ginecología [Internet]. 2018 [citado 18 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://medicina.uc.cl/wp->

content/uploads/2018/08/Manual-Obstetricia-y-Ginecologi%CC%81a-2018.pdf

35. Addis N, Abraham D, Getnet M, Bishaw A, Mengistu Z. Prevalence and associated factors of maternal birth trauma following vaginal delivery at University of Gondar Comprehensive Specialized Hospital, North-West Ethiopia, 2022. *BMC Pregnancy Childbirth*. 27 de junio de 2024;24(1):445.
36. Gómez M, Danglot C, Aceves M. Clasificación de los niños recién nacidos [Internet]. *Revista mexicana de pediatría*. 2012 [citado 20 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-2012/sp121g.pdf>
37. Aragón Hernández J, Ávila Vergara MA, Beltrán Montoya, J., Calderón Cisneros E, Caldiño Soto F, Castilla-Zenteno A, et al. Protocolo clínico para inducción del trabajo de parto: propuesta de consenso. *Ginecol Obstet México*. 2017;85(5):314-24.
38. Díaz S. L. Características Maternas, Obstétricas Y Neonatales en púerperas con desgarro perineal atendidas en el Hospital Nacional Hipólito Unanue [Internet]. 2017 [citado 18 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.uwiener.edu.pe/server/api/core/bitstreams/c788258a-fa33-419e-b77c-5dded368bad9/content>
39. Addisu D, Fentahun B. Risk factors associated with severe perineal tear at Public Hospitals in Bahir Dar town, Northwest Ethiopia. *SAGE Open Med*. 1 de junio de 2024;12:20503121241252956.
40. García Lorca AI, Martínez M de los ÁV, Ballesteros Meseguer C, Fernández Alarcón M de las M, Carrillo García C, García-Lorca AI. Tasa de episiotomía en el Hospital Clínico Universitario de La Arrixaca y factores que influyen en su práctica. *Rev Esp Salud Pública* [Internet]. 2019 [citado 18 de febrero de 2025];93. Disponible en:

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1135-57272019000100138&lng=es&nrm=iso&tlng=es

41. Chuquimantari Zevallos, R. Revisión sistemática del uso de la episiotomía y sus complicaciones perineales [Internet]. 2021 [citado 20 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.uwiener.edu.pe/server/api/core/bitstreams/ba89a682-3245-4914-b340-9063f9267d40/content>
42. Guittier MJ, Othenin-Girard V, Irion O, Boulvain M. Maternal positioning to correct occipito-posterior fetal position in labour: a randomised controlled trial. *BMC Pregnancy Childbirth*. 24 de febrero de 2014;14(1):83.
43. Malpractice P. Fundamentals of Compound Presentation in Labor and Delivery in New Jersey [Internet]. *Pediatric Malpractice Guide | Birth Injury Resource Center*. 2024 [citado 18 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://pediatricmalpracticeguide.com/fundamentals-of-compound-presentation-in-labor-and-delivery/>
44. Artega M M, Ballon B MV. Factores Maternos Y Fetales Causantes De Desgarros Perineales En Pacientes Multiparas En El Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa 2019 [Internet]. 2021 [citado 18 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.ucsm.edu.pe/server/api/core/bitstreams/982fea5e-381b-4a68-ac21-9a902993cb3a/content>
45. Vitale E. Introducción a la relación causa efecto [Internet]. Factores de riesgo y causalidad. 2003 [citado 21 de febrero de 2025]. Disponible en: https://ccp.ucr.ac.cr/cursos/epidistancia/contenido/4_epidemiologia.htm#inicio
46. Álvarez Martínez H, Pérez Campos E. Causalidad en medicina [Internet]. *Historia y filosofía de la medicina*. 140d. C. [citado 21 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/gmm/v140n4/v140n4a18.pdf>

47. Hospital Sant Joan de Déu |. Disfunciones De Suelo Pélvico Y Lesiones Perineales De Origen Obstétrico: Prevención, Diagnóstico, Tratamiento Y Seguimiento. [Internet]. [citado 18 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://fetalmedicinebarcelona.org/wp-content/uploads/2024/02/Lesiones-perineales-de-origen-obstetrico.pdf>
48. Sociedad Española de Ginecología Obstetricia. Lesión obstétrica del esfínter anal. Otros desgarros perineales [Internet]. 2020 [citado 19 de febrero de 2025]. Disponible en: https://sego.es/documentos/progresos/v63-2020/n1/10_Lesion_obstetrica_del_esfinter_anal._Otros_desgarros_perineales_2019.pdf
49. Gadó K, Khodier M, Virág A, Domján G, Dörnyei G. Anemia of geriatric patients. *Physiol Int*. 16 de junio de 2022;109(2):119-34.
50. Sedicias S. Control prenatal: cuándo se debe comenzar, consultas y exámenes [Internet]. *Tua Saúde*. 2021 [citado 17 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://www.tuasaude.com/es/prenatal/>
51. Arapa C. Desgarro perineal [Internet]. [citado 7 de noviembre de 2024]. Disponible en: https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/14096/2/IV_FCS_502_TE_Arapa_Chambi_2024.pdf
52. Morera E. ¿Cómo se calcula la edad gestacional? [Internet]. *Menudos Peques - Todo sobre el embarazo, bebés y niños. Consejos, guías y recursos para padres y madres*. 2023 [citado 18 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://www.menudospeques.net/embarazo/salud-cuidados/mide-edad-gestacional>
53. Universidad de Buenos Aires. Definiciones y conceptos [Internet]. *campus académica, secretaria de asuntos académicos*. 2025 [citado 8 de noviembre de 2024]. Disponible en: <https://campuscitep.rec.uba.ar/mod/glossary/view.php?id=11413&mode=letter&hook=N&sortkey&sortorder>

54. Rae. Definición de estado civil - Diccionario panhispánico del español jurídico - RAE [Internet]. Diccionario panhispánico del español jurídico - Real Academia Española. [citado 8 de noviembre de 2024]. Disponible en: <https://dpej.rae.es/lema/estado-civil>
55. GPC. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Quirúrgico de Episiotomía Complicada [Internet]. Guía de Práctica Clínica. [citado 8 de noviembre de 2024]. Disponible en: <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/608GRR.pdf>
56. Calcular índice de masa corporal (IMC) en adultos [Internet]. 2025 [citado 22 de enero de 2025]. Disponible en: <https://www.gob.pe/14806-calcular-indice-de-masa-corporal-imc-en-adultos>
57. Casanova R. Intrapartum care [Internet]. Mayo Clinic, Beckmann and Ling's Obstetrics and Gynecology. 9th ed. Kindle edition. Wolters Kluwer. 2024 [citado 22 de enero de 2025]. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/labor-and-delivery/in-depth/inducing-labor/art-20047557>
58. Evaluación de la paciente obstétrica - Ginecología y obstetricia [Internet]. Manual MSD versión para profesionales. [citado 8 de noviembre de 2024]. Disponible en: <https://www.msmanuals.com/es/professional/ginecología-y-obstetricia/abordaje-de-la-mujer-embarazada-y-atención-prenatal/evaluación-de-la-paciente-obstétrica>
59. Bamba V, Kelly A. Assessment of growth [Internet]. Kliegman RM, St. Geme JW, Blum NJ, Shah SS, Tasker RC, Wilson KM, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 21st ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2020:chap 27. [citado 8 de noviembre de 2024]. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002379.htm>
60. Zavala-García A, Ortiz-Reyes H, Salomon-Kuri J, Padilla-Amigo C, Preciado Ruiz R. Periodo intergenésico: Revisión de la literature. Rev Chil Obstet Ginecol. febrero de 2018;83(1):52-61.

61. Melo Bastidas LJ, Guerrero Portilla MP, Gómez Mercado CA, Quirós-Gómez OI. Factores maternos asociados al peso del recién nacido en una IPS de Medellín, Colombia, 2018. *Perspect En Nutr Humana*. junio de 2021;23(1):39-52.
62. Williams Obstetricia. Trabajo de parto normal [Internet]. 24e Eds. F. Gary Cunningham, et al. McGraw-Hill Education, 2015. [citado 22 de enero de 2025]. Disponible en: <https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1525§ionid=100458866>
63. Asale R, Rae. Procedencia | Diccionario de la lengua española [Internet]. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. [citado 22 de enero de 2025]. Disponible en: <https://dle.rae.es/procedencia>
64. Hernández Sampiere. Metodología de la investigación [Internet]. Metodología de la investigación. 2014 [citado 7 de noviembre de 2024]. Disponible en: <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf>
65. Ramirez A. Metodología de la Investigación Científica [Internet]. 1997 [citado 23 de febrero de 2025]. Disponible en: https://eva.fing.edu.uy/pluginfile.php/361028/mod_resource/content/1/Ram%C3%ADrez%20-%20Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20investigaci%C3%B3n.pdf

ANEXOS

Anexo 01: Matriz de consistencia

Título: “FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL DESGARRO PERINEAL EN PUERPERAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO – OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III - ESSALUD, JULIACA 2024.”

Responsables:

- Mamani Gonzales Dayerli Kaori
- Cornejo Gadea Laura Fiorella

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
<p>Problema general</p> <p>¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III, ESSALUD, Juliaca 2024</p>	<p>Objetivo general</p> <p>Analizar los factores de riesgo asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III, ESSALUD, Juliaca 2024</p>	<p>Hipótesis general</p> <p>Existen factores de riesgo maternos, gineco-obstétricos y neonatales asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el Hospital III, ESSALUD, Juliaca.</p>	<p>Variable 1:</p> <p>Factores de riesgo</p> <p><u>Dimensiones:</u></p> <p>- D.1: factores maternos</p> <p>- D.2: factores gineco-obstétricos</p>	<p>Enfoque:</p> <p>Cuantitativo</p> <p>Tipo: correlacional prospectivo de corte transversal</p> <p>Tipo de investigación:</p> <p>Correlacional</p> <p>Nivel: No Experimental</p> <p>Diseño: no experimental.</p>
<p>Problemas específicos</p> <p>P.E.1</p>	<p>Objetivos específicos:</p> <p>O.E.1</p>	<p>Hipótesis específicas:</p> <p>H.E.1</p>		

<p>¿Cuáles son los factores de riesgos maternos asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital III - Essalud, Juliaca 2024?</p> <p>P.E.2</p> <p>¿Cuáles son los factores de riesgo gineco-obstétricos asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III, ESSALUD, Juliaca 2024?</p>	<p>Determinar los factores de riesgo maternos asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco - Obstetricia Hospital III - Essalud, Juliaca 2024.</p> <p>O.E.2</p> <p>Establecer los factores de riesgo gineco-obstétricos asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia de Hospital III - Essalud, Juliaca 2024.</p>	<p>El factor de riesgo maternos se relaciona significativamente con el desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III - Essalud, Juliaca 2024.</p> <p>H.E.2</p> <p>El factor de riesgo gineco- obstétrico se relacionan significativamente con el desgarro perineal en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III - Essalud, Juliaca 2024.</p>	<p>- D.3.: factores neonatales</p> <p>Variable 2: Desgarro perineal</p> <p>Dimensiones:</p> <p>- D.1:</p>	<p>Formula de</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD M --> V1 M --> V2 V1 <--> R V2 </pre> </div> <p>investigación</p> <p>M = Puérperas atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia en el Hospital III – Essalud en el periodo de enero a octubre 2024.</p> <p>V1 = Factores de riesgo</p> <p>V2 = severidad de desgarro</p> <p>R = Relación</p> <p>Población: La presente</p>
---	--	---	---	--

<p>P.E.3</p> <p>¿Cuáles son los factores de riesgo neonatales asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco- Obstetricia del Hospital III - Essalud, Juliaca 2024? .</p>	<p>O.E.3</p> <p>Explicar los factores de riesgo neonatales asociados al desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco- Obstetricia del Hospital III - Essalud, Juliaca 2024.</p>	<p>H.E.3</p> <p>El factor de riesgo neonatales se relaciona significativamente con el desgarro perineal en puérperas atendidas en el servicio de Gineco- Obstetricia del Hospital III - Essalud, Juliaca 2024.</p>	<p>investigación la población está conformada por 353 puérperas que fueron atendidas en el servicio de Gineco – obstétrica del Hospital III – Essalud Juliaca.</p> <p>Muestra: Muestra censal</p> <p>Muestreo: No probabilístico por conveniencia</p> <p>Técnica: Recolección de datos.</p> <p>Instrumentos: ficha de recolección de datos</p>
--	---	---	--

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos

INVESTIGACIÓN: “FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL DESGARRO PERINEAL EN PUERPERAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO – OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III - ESSALUD, JULIACA 2024”

Ficha de recolección de datos N°:

1: Datos generales:

Numero de historia clínica:

2: Datos de variables:

VARIABLE: FACTORES DE RIESGO

FACTORES MATERNOS

- ✓ **Edad materna**
 - 14 -19 años
 - 20 – 34 años
 - 35 años a más

- ✓ **Grado de instrucción**
 - Primaria
 - Secundaria
 - Superior

- ✓ **Estado civil**
 - Soltera
 - Conviviente
 - Casada

- ✓ **Zona**
 - Urbana
 - Rural

- ✓ **Anemia**
 - Sin anemia
 - Leve Hb: 10.0 – 10.9 g/dl

- Moderada Hb: 7.0 – 9.0 g/dl
- Severa Hb: < 7.0 g/dl
- ✓ **ITU**
 - No tiene ITU
 - ITU bajo (.....)
 - ITU alto (.....)

- ✓ **IMC gestacional**
 - Obesidad
 - Sobrepeso
 - Normal
 - Bajo peso

FACTORES GINECO-OBSTETRICO

- ✓ **Controles prenatales**
 - Sin CPN
 - ≤ 6 CPN
 - > 6 CPN

- ✓ **Paridad**
 - Primípara
 - Multípara
 - Gran multípara

- ✓ **Periodo intergenésico**
 - Adecuado
 - Corto
 - largo

- ✓ **Edad gestacional**
 - Post termino o maduro
 - A termino
 - Prematuro

- ✓ **Psicoprofilaxis**
 - Si realizo
 - No realizo

- ✓ **Inducción**
 - Si
 - No

- ✓ **Periodo expulsivo prolongado**
 - No
 - Si

- ✓ **Episiotomía**
 - Si realizo
 - No realizo

- ✓ **Presentación fetal**
 - Occipitoanterior
 - Occipitoposterior

- ✓ **Presentación compuesta**
 - No
 - Si

FACTORES NEONATALES

- ✓ **Sexo**
 - Femenino
 - Masculino

- ✓ **Peso al nacer**
 - ≥ 4.000 gr
 - ≥ 2.500 gr. a 3.999 gr.
 - 1.500 gr. a 2.499 gr.

✓ **Perímetro cefálico**

- ≥ 35 cm
- < 34 cm

VARIABLE: DESGARRO PERINEAL

✓ **SEVERIDAD DE DESGARRO**

- Sin desgarro
- I grado
- II grado
- III grado
- IV grado

Anexo 3: Ficha de validación de instrumentos de medición

Fichas firmadas por los expertos

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

I. DATOS GENERALES

Título de la Investigación: Factores de riesgo asociados a dengue primario en puercos

Nombre del Experto: Obsl. Dominga Lourdes Carrizales Pardo

II. ASPECTOS QUE VALIDAR EN EL INSTRUMENTO:

Aspectos Para Evaluar	Descripción:	Evaluación Cumple/ No cumple	Preguntas por corregir
1. Claridad	Las preguntas están elaboradas usando un lenguaje apropiado	✓	
2. Objetividad	Las preguntas están expresadas en aspectos observables	✓	
3. Conveniencia	Las preguntas están adecuadas al tema a ser investigado	✓	
4. Organización	Existe una organización lógica y sintáctica en el cuestionario	✓	
5. Suficiencia	El cuestionario comprende todos los indicadores en cantidad y calidad	✓	
6. Intencionalidad	El cuestionario es adecuado para medir los indicadores de la investigación	✓	
7. Consistencia	Las preguntas están basadas en aspectos teóricos del tema investigado	✓	
8. Coherencia	Existe relación entre las preguntas e indicadores	✓	
9. Estructura	La estructura del cuestionario responde a las preguntas de la investigación	✓	
10. Pertinencia	El cuestionario es útil y oportuno para la investigación	✓	

III. OBSERVACIONES GENERALES

Apellidos y Nombres del validador:

Grado académico: Especialista educación sexual y Salud Reproductiva del Adolescente.
N°. DNI: 02558060

Ficha de validación por juicio de expertos

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE ICA

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

I. DATOS GENERALES

Título de la Investigación: Factores de Riesgo asociados a desgarro perineal en puerperas
 Nombre del Experto: Dra Dina Parisuana Ito

II. ASPECTOS QUE VALIDAR EN EL INSTRUMENTO:

Aspectos Para Evaluar	Descripción:	Evaluación Cumple/ No cumple	Preguntas por corregir
1. Claridad	Las preguntas están elaboradas usando un lenguaje apropiado	✓	
2. Objetividad	Las preguntas están expresadas en aspectos observables	✓	
3. Conveniencia	Las preguntas están adecuadas al tema a ser investigado	✓	
4. Organización	Existe una organización lógica y sintáctica en el cuestionario	✓	
5. Suficiencia	El cuestionario comprende todos los indicadores en cantidad y calidad	✓	
6. Intencionalidad	El cuestionario es adecuado para medir los indicadores de la investigación	✓	
7. Consistencia	Las preguntas están basadas en aspectos teóricos del tema investigado	✓	
8. Coherencia	Existe relación entre las preguntas e indicadores	✓	
9. Estructura	La estructura del cuestionario responde a las preguntas de la investigación	✓	
10. Pertinencia	El cuestionario es útil y oportuno para la investigación	✓	

III. OBSERVACIONES GENERALES

Dina Parisuana Ito
 OBSTETRA
 COP 19861
 Apellidos y Nombres del validador: Dr. En Salud Pública
 Grado académico: Dr. En Salud Pública
 N°. DNI: 02432678

Ficha de validación por juicio de expertos

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE ICA

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

I. DATOS GENERALES

Título de la Investigación: Factores de riesgo asociados a desgarro perineal en puerperas

Nombre del Experto: Obstetra Serofina Alicia Pariguano Galicia

II. ASPECTOS QUE VALIDAR EN EL INSTRUMENTO:

Aspectos Para Evaluar	Descripción:	Evaluación Cumple/ No cumple	Preguntas por corregir
1. Claridad	Las preguntas están elaboradas usando un lenguaje apropiado	✓	
2. Objetividad	Las preguntas están expresadas en aspectos observables	✓	
3. Conveniencia	Las preguntas están adecuadas al tema a ser investigado	✓	
4. Organización	Existe una organización lógica y sintáctica en el cuestionario	✓	
5. Suficiencia	El cuestionario comprende todos los indicadores en cantidad y calidad	✓	
6. Intencionalidad	El cuestionario es adecuado para medir los indicadores de la investigación	✓	
7. Consistencia	Las preguntas están basadas en aspectos teóricos del tema investigado	✓	
8. Coherencia	Existe relación entre las preguntas e indicadores	✓	
9. Estructura	La estructura del cuestionario responde a las preguntas de la investigación	✓	
10. Pertinencia	El cuestionario es útil y oportuno para la investigación	✓	

III. OBSERVACIONES GENERALES

Obstetra Serofina Alicia Pariguano Galicia
ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS
COP. 2629 RNE: 2434-E.01.1

Apellidos y Nombres del validador:
Grado académico:
N°. DNI: 29294890

Ficha de validación por juicio de expertos

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE ICA

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

I. DATOS GENERALES

Título de la Investigación: Factores de riesgo asociados a desgarro perineal en puérperas
 Nombre del Experto: Dr. Apaza Pérez Ronald F.

II. ASPECTOS QUE VALIDAR EN EL INSTRUMENTO:

Aspectos Para Evaluar	Descripción:	Evaluación Cumple/ No cumple	Preguntas por corregir
1. Claridad	Las preguntas están elaboradas usando un lenguaje apropiado	✓	
2. Objetividad	Las preguntas están expresadas en aspectos observables	✓	
3. Conveniencia	Las preguntas están adecuadas al tema a ser investigado	✓	
4. Organización	Existe una organización lógica y sintáctica en el cuestionario	✓	
5. Suficiencia	El cuestionario comprende todos los indicadores en cantidad y calidad	✓	
6. Intencionalidad	El cuestionario es adecuado para medir los indicadores de la investigación	✓	
7. Consistencia	Las preguntas están basadas en aspectos teóricos del tema investigado	✓	
8. Coherencia	Existe relación entre las preguntas e indicadores	✓	
9. Estructura	La estructura del cuestionario responde a las preguntas de la investigación	✓	
10. Pertinencia	El cuestionario es útil y oportuno para la investigación	✓	

III. OBSERVACIONES GENERALES

 Apellidos y Nombres del validador:
 Grado académico: Dr. APAZA PÉREZ Ronald F.
 N° DNI: 8002707 GINECÓLOGO OBSTETRA
 OMP. 50842 RNE. 33069

Ficha de validación por juicio de expertos

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE ICA

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

I. DATOS GENERALES

Título de la Investigación: Factores de Riesgo asociado a descañonamientos

Nombre del Experto: Tony Roal Tello Ramos

II. ASPECTOS QUE VALIDAR EN EL INSTRUMENTO:

Aspectos Para Evaluar	Descripción:	Evaluación Cumple/ No cumple	Preguntas por corregir
1. Clandad	Las preguntas están elaboradas usando un lenguaje apropiado	Cumple	
2. Objetividad	Las preguntas están expresadas en aspectos observables	Cumple	
3. Conveniencia	Las preguntas están adecuadas al tema a ser investigado	no cumple	no corresponde al tema
4. Organización	Existe una organización lógica y sintáctica en el cuestionario	Cumple	
5. Suficiencia	El cuestionario comprende todos los indicadores en cantidad y calidad	Cumple	
6. Intencionalidad	El cuestionario es adecuado para medir los indicadores de la investigación	Cumple	
7. Consistencia	Las preguntas están basadas en aspectos teóricos del tema investigado	Cumple	
8. Coherencia	Existe relación entre las preguntas e indicadores	Cumple	
9. Estructura	La estructura del cuestionario responde a las preguntas de la investigación	Cumple	
10. Pertinencia	El cuestionario es útil y oportuno para la investigación	Cumple	

III. OBSERVACIONES GENERALES

Dr. Tony Roal Tello Ramos

Esp. Ginecología y Obstetricia

CMF 70489 RNE 047290
Apellidos y Nombres del validador:

Grado académico: Especialista en Ginecología y Obstetricia

N°. DINI: 43478924

Tabla de validación a través de V de Aiken

ITEM	CALIFICACIONES DE LOS JUECES					SUMA	V
	JUEZ 1	JUEZ 2	JUEZ 3	JUEZ 4	JUEZ 5		
1	1	1	1	1	1	5	1.00
2	1	1	1	1	1	5	1.00
3	1	1	1	1	0	4	0.80
4	0	1	1	1	1	4	0.80
5	1	1	1	1	1	5	1.00
6	1	1	1	1	1	5	1.00
7	1	1	1	1	1	5	1.00
8	1	1	1	1	1	5	1.00
9	1	1	1	1	1	5	1.00
10	1	1	1	1	1	5	1.00
11	1	1	1	1	1	5	1.00
V DE AIKEN GENERAL							0.96

ANEXO 04: BASE DE DATOS

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD DE ALFA DE CRONBACH

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de	
Cronbach	N de elementos
,671	21

PUE RPE RAS	ITEMS																					SUM A
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
P1	3	2	2	1	3	1	2	3	2	3	2	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	37
P2	2	1	2	1	1	1	2	3	2	2	3	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	33
P3	2	1	3	2	3	1	1	3	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	36
P4	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	3	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	45
P5	2	1	3	1	2	3	3	3	1	3	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	39
P6	3	2	2	2	1	2	2	3	2	3	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	37
P7	2	1	2	1	2	1	2	3	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	34
P8	2	1	2	1	2	2	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	30
P9	2	1	2	1	2	2	2	3	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	1	33
P10	2	1	2	1	1	1	2	3	2	3	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	34
P11	2	1	2	1	2	1	1	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	32
P12	2	1	2	2	1	1	2	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	32
P13	2	1	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	37
P14	2	1	3	1	1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	30
P15	2	1	2	2	3	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	32
P16	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	42
P17	2	1	3	1	3	2	2	3	2	3	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	38
P18	1	2	1	1	3	2	4	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	35
P19	2	1	2	1	1	1	3	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	31
P20	3	1	3	1	1	1	2	3	1	3	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	35
P21	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	1	2	1	1	2	2	2	2	43
P22	2	1	3	1	3	1	1	3	2	2	3	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	37
P23	3	1	3	1	1	1	3	3	2	3	3	3	2	1	1	2	1	2	3	2	1	42
P24	2	1	3	1	1	2	3	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	2	33
P25	3	1	3	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	36
P26	2	1	2	1	1	2	3	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	32
P27	2	1	3	1	3	2	3	2	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	37
P28	2	1	2	2	1	1	2	3	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	34
P29	2	2	2	1	1	1	2	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	31
P30	2	2	3	1	1	3	3	2	2	3	3	3	2	1	1	2	1	2	3	2	1	43
VARI ANZ A	0.206	0.196	0.289	0.210	0.782	0.507	0.493	0.179	0.139	0.796	0.606	0.290	0.090	0.000	0.232	0.090	0.090	0.249	0.062	0.222	0.196	
SUMATORIA DE VARIANZAS	5.922																					
VARIANZA DE LA SUMA DE LOS ÍTEMS	16.422																					

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{S_T^2} \right]$$

α: Coeficiente de confiabilidad del cuestionario

0.6713

k: Número de ítems del instrumento

21

$\sum_{i=1}^k S_i^2$: Sumatoria de las varianzas de los ítems.

5.922

S_T²: Varianza total del instrumento.

16.422

RANGO	CONFIABILIDAD
0.53 a menos	Confiabilidad nula
0.54 a 0.59	Confiabilidad baja
0.60 a 0.65	Confiable
0.66 a 0.71	Muy confiable
0.72 a 0.99	Excelente confiabilidad
1	Confiabilidad perfecta

Anexo 4: Base de datos

data.sav [ConjuntoDatos1] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

	Nombre	Tipo	Anchura	Decimales	Etiqueta	Valores	Perdidos	Columnas	Alineación	Medida	Rol
1	Edad	Cadena	14	0	EDAD MATERNA	{1, 14 -19 a...	Ninguno	14	Izquierda	Nominal	Entrada
2	GradoInstruccion	Cadena	11	0	GRADO DE INSTRUCCIÓN	{1, Primaria}...	Ninguno	11	Izquierda	Nominal	Entrada
3	EstadoCivil	Cadena	11	0	ESTADO CIVIL	{1, Soltera}...	Ninguno	11	Izquierda	Nominal	Entrada
4	Zona	Cadena	6	0	ZONA	{1, Urbana}...	Ninguno	6	Izquierda	Nominal	Entrada
5	Anemia	Cadena	29	0	ANEMIA	{0, Sin ane...	Ninguno	29	Izquierda	Nominal	Entrada
6	Itu	Cadena	12	0	ITU	{1, Alto}...	Ninguno	12	Izquierda	Nominal	Entrada
7	Imc	Cadena	9	0	IMC	{1, obesidad...	Ninguno	9	Izquierda	Nominal	Entrada
8	ControlesPrenatales	Cadena	14	0	CONTROLES PRENATAL	{1, Sin contr...	Ninguno	14	Izquierda	Nominal	Entrada
9	Psicoprofilaxis	Cadena	10	0	PSICOPROFILAXIS	{1, No realiz...	Ninguno	10	Izquierda	Nominal	Entrada
10	Paridad	Cadena	15	0	PARIDAD	{1, Primipar...	Ninguno	15	Izquierda	Nominal	Entrada
11	PeriodoIntergenesico	Cadena	8	0	PERIODO INTERGENESICO	{1, Corto}...	Ninguno	8	Izquierda	Nominal	Entrada
12	EdadGestacional	Cadena	19	0	EDAD GESTACIONAL	{1, Madura}...	Ninguno	19	Izquierda	Nominal	Entrada
13	Induccion	Cadena	3	0	INDUCCION	{1, No}...	Ninguno	3	Izquierda	Nominal	Entrada
14	PeriodoExpulsivoProlongado	Cadena	2	0	PERIODO EXPULSIVO PROL...	{1, No}...	Ninguno	2	Izquierda	Nominal	Entrada
15	Episiotomia	Cadena	11	0	EPISIOTOMIA	{1, No}...	Ninguno	11	Izquierda	Nominal	Entrada
16	PresentacionFetal	Cadena	19	0	PRESENTACION FETAL	{1, Occipito...	Ninguno	19	Izquierda	Nominal	Entrada
17	PresentacionCompuesta	Cadena	2	0	PRESENTACION COMPUESTA	{1, No}...	Ninguno	2	Izquierda	Nominal	Entrada
18	Sexo	Cadena	9	0	SEXO	{1, Masculin...	Ninguno	9	Izquierda	Nominal	Entrada
19	PesoalNacer	Cadena	23	0	PESO AL NACER	{1, ≥ 4.000 ...	Ninguno	23	Izquierda	Nominal	Entrada
20	PerimetroCefalico	Cadena	4	0	PERIMETRO CEFALICO	{1, ≤ 34 cm}...	Ninguno	14	Izquierda	Nominal	Entrada
21	TipodeDesgarro	Cadena	12	0	TIPO DE DESGARRO	{0, Sin desg...	Ninguno	12	Izquierda	Nominal	Entrada
22											
23											
24											
--											

Vista de datos **Vista de variables**

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicode ACTIVADO

*Sin título2 [ConjuntoDatos2] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

6: Visible: 21 de 21 variables

	EDAD_M ATERNA	GRAD O_DE INSTR.	ESTA DO_C IVIL	ZON A	ANE MIA DUR.	ITU_D URAN TE_EL	IMC	CON TRO L_PR	PSIC ROFI	PARI DAD	PER ODO _INT.	ED# D_G EST.	INDUC CIO	PEF IOD O_E	EPISI OTOM IA	PRE SENT ACIO	PRES ENTA CION	SEX O	PE SO AL	PERI MET RO	SEVE RIDA D_DE
1	3	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	3
2	2	1	3	1	2	3	3	2	1	3	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	3
3	3	2	2	2	1	2	2	3	2	3	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2
4	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	3
5	1	2	1	1	3	2	4	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2
6	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	1	2	1	1	2	2	2	2
7	2	1	3	1	3	1	1	3	2	2	3	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2
8	2	1	3	1	1	2	3	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2
9	3	1	3	1	1	1	2	3	2	3	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2
10	2	1	2	1	3	1	2	3	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2
11	2	2	2	1	3	2	2	3	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2
12	2	1	3	1	2	3	2	3	2	3	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	3
13	2	1	3	1	3	3	1	3	2	2	3	1	2	1	2	1	1	1	2	1	3
14	3	1	3	1	2	2	1	3	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	3
15	2	1	2	1	2	1	2	3	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
16	3	2	3	1	2	1	3	3	2	3	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2
17	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2
18	2	1	2	2	2	1	2	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2
19	3	1	2	1	3	2	1	3	1	3	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2
20	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	3	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2
21	2	1	2	1	1	1	1	3	2	3	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2

Vista de datos **Vista de variables**

IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Visible: 21 de 21 variables

	EDAD_MATERNA	GRADO_DE_INSTR.	ESTADO_CIVIL	ZONA	ANEMIA_DUR.	ITU_CURANTE	IMC	CON_TRO_L_PR	PSICOPROFILAXI.	PARI_DAD	PERODO_INT.	EDAD_EST.	INDUC_CIO	PEF_IOD_O_E	EPISOTOMIA	PRESENACIO.	PRESENTACION	SEXO	PE_SO_AL	PERI_METRO	SEVERIDAD_DE
1	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	3	2	2	1	2	1	2	2	2	2	3
2	2	1	3	1	2	3	3	2	1	3	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	3
3	3	2	2	2	1	2	2	3	2	3	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2
4	2	2	2	2	3	3	3	2	3	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	3
5	1	2	1	1	3	2	4	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2
6	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	2	1	2	1	1	2	2	2
7	2	1	3	1	3	1	1	3	2	2	3	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2
8	2	1	3	1	1	2	3	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2
9	3	1	3	1	1	1	2	3	2	3	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2
10	2	1	2	1	3	1	2	3	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2
11	2	2	2	1	3	2	2	3	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2
12	2	1	3	1	2	3	2	3	2	3	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	3
13	2	1	3	1	3	3	1	3	2	2	3	1	2	1	2	1	1	1	2	1	3
14	3	1	3	1	2	2	1	3	2	3	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	3
15	2	1	2	1	2	1	2	3	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
16	3	2	3	1	2	1	3	3	2	3	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2
17	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2
18	2	1	2	2	2	1	2	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2
19	3	1	2	1	3	2	1	3	1	3	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2
20	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	3	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2
21	2	1	2	1	1	1	1	3	2	3	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2

Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Visible: 21 de 21 variables

	EDAD_MATERNA	GRADO_DE_INSTR.	ESTADO_CIVIL	ZONA	ANEMIA_DUR.	ITU_CURANTE	IMC	CON_TRO_L_PR	PSICOPROFILAXI.	PARI_DAD	PERODO_INT.	EDAD_EST.	INDUC_CIO	PEF_IOD_O_E	EPISOTOMIA	PRESENACIO.	PRESENTACION	SEXO	PE_SO_AL	PERI_METRO	SEVERIDAD_DE
22	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	1	2	1	1	2	3	2
23	2	2	2	2	2	2	1	3	2	3	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2
24	2	1	3	1	2	2	1	2	2	3	2	3	2	1	2	1	1	1	3	1	2
25	2	1	2	1	3	1	3	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2
26	3	1	2	1	1	2	2	3	2	3	3	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2
27	2	1	2	1	2	3	2	3	1	3	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2
28	2	1	2	2	2	3	2	3	1	3	2	3	2	1	2	1	1	2	3	2	3
29	2	2	2	1	2	3	1	3	2	3	2	1	2	1	2	1	1	2	2	2	3
30	3	1	3	1	3	1	2	3	1	2	3	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2
31	2	1	2	1	1	2	3	3	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2
32	2	1	3	1	2	2	2	3	2	3	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2
33	2	1	2	1	1	3	2	2	2	2	3	1	2	1	2	1	1	2	2	2	3
34	2	2	3	1	2	2	2	3	1	3	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2
35	2	1	2	1	2	3	2	3	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2
36	3	2	3	1	3	3	1	3	1	3	3	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2
37	2	2	3	1	1	2	3	3	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
38	2	1	2	2	1	1	2	3	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2
39	2	1	2	1	2	1	2	3	2	2	3	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2
40	2	1	2	1	1	2	2	3	2	2	3	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2
41	3	2	2	1	2	2	1	3	2	3	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
42	2	1	2	1	1	1	1	3	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2

Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Visible: 21 de 21 variables

	EDAD_MATERNA	GRADO_DE_INSTR.	ESTADO_CIVIL	ZONA	ANEMIA_DUR.	ITU_CURANTE	IMC	CON_TRO_L_PR	PSICOPROFILAXI.	PARI_DAD	PERODO_INT.	EDAD_EST.	INDUC_CIO	PEF_IOD_O_E	EPISOTOMIA	PRESENACIO.	PRESENTACION	SEXO	PE_SO_AL	PERI_METRO	SEVERIDAD_DE
43	2	1	2	1	3	2	3	3	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	3
44	2	1	2	1	2	3	3	3	2	2	3	2	2	1	2	1	1	1	2	2	3
45	2	1	3	1	1	1	1	2	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2
46	2	2	3	1	2	2	2	2	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2
47	2	1	2	2	2	3	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	3
48	2	1	2	2	2	1	2	3	1	3	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2
49	2	2	2	1	3	2	2	3	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	3
50	1	3	1	1	2	3	4	3	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	3
51	2	1	2	1	1	3	3	2	2	1	1	3	2	1	2	1	1	2	3	2	2
52	2	2	3	1	2	2	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2
53	2	1	2	1	1	2	3	3	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2
54	3	1	3	1	2	1	2	3	2	3	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2
55	3	1	3	1	1	2	2	3	2	3	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2
56	3	1	2	2	1	2	3	2	2	3	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2
57	3	1	2	2	1	3	1	3	2	3	3	2	2	1	2	1	2	2	2	1	3
58	3	1	3	1	3	3	3	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	3
59	3	2	2	1	1	3	3	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2
60	3	2	2	1	2	3	2	3	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2
61	3	2	2	1	2	2	2	3	2	3	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2
62	3	2	3	1	2	2	2	3	2	3	3	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2
63	2	1	2	1	1	3	3	3	2	2	3	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2

Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Visible: 21 de 21 variables

	EDAD_M ATERNA	GRAD O_DE_ INSTR.	ESTA DO_C IVIL	ZON A	ANE MIA_ DUR.	ITU_D URAN TE_EL	IMC	CON TRO_ L_PR	PSIC ROP ROFI.	PARI DAD	PER ODO_ INT.	ED# D_G EST.	INDUC CIO	PEF IOD_ O_E.	EPISI OTOM IA	PRE SENT ACIO.	PRES ENTA CION.	SEX O	PE SO_ AL.	PERI MET RO.	SEVE RIDA D_DE.
64	3	1	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	3
65	3	1	2	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2
66	2	2	2	1	1	3	1	3	2	3	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2
67	2	1	2	1	2	2	2	3	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2
68	3	2	2	2	1	1	3	2	2	2	3	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2
69	3	1	2	1	1	2	3	3	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2
70	3	1	2	1	3	2	2	2	2	2	3	1	1	1	2	1	1	1	2	2	3
71	3	1	3	1	2	3	1	3	2	2	3	2	2	1	2	1	1	1	2	2	3
72	2	1	3	1	1	3	3	3	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2
73	3	1	3	1	1	1	3	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2
74	2	2	3	1	3	3	2	3	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	3
75	3	1	3	1	1	1	2	3	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2
76	3	1	2	1	2	1	3	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2
77	2	1	3	1	1	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2
78	2	1	2	1	1	2	3	3	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	1	2
79	2	2	2	1	2	2	3	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2
80	2	2	3	1	1	2	2	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2
81	2	2	2	1	1	2	2	3	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2
82	2	1	2	2	3	2	3	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2
83	2	1	2	1	1	1	2	3	2	2	3	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2
84	2	1	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2

Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicode:ACTIVADO

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Visible: 21 de 21 variables

	EDAD_M ATERNA	GRAD O_DE_ INSTR.	ESTA DO_C IVIL	ZON A	ANE MIA_ DUR.	ITU_D URAN TE_EL	IMC	CON TRO_ L_PR	PSIC ROP ROFI.	PARI DAD	PER ODO_ INT.	ED# D_G EST.	INDUC CIO	PEF IOD_ O_E.	EPISI OTOM IA	PRE SENT ACIO.	PRES ENTA CION.	SEX O	PE SO_ AL.	PERI MET RO.	SEVE RIDA D_DE.
85	3	2	3	1	1	2	2	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2
86	2	2	2	1	3	1	4	3	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	3
87	2	1	3	1	1	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	3
88	3	1	2	1	1	1	2	3	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2
89	2	1	2	1	1	1	3	3	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2
90	3	1	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2
91	2	1	3	1	1	1	2	3	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2
92	1	2	1	2	3	1	4	3	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	3
93	2	2	3	1	1	2	3	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2
94	3	1	2	1	2	1	3	3	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
95	2	1	3	2	1	3	2	3	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2
96	2	1	2	2	3	2	3	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2
97	2	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2
98	2	1	2	1	3	1	2	3	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2
99	2	2	2	1	1	1	3	3	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2
100	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2
101	3	1	2	1	1	1	3	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2
102	3	1	2	2	2	1	2	3	1	2	3	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2
103	3	1	3	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2
104	3	2	2	2	1	2	3	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2
105	2	1	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	2

Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicode:ACTIVADO

IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Visible: 21 de 21 variables

	EDAD_M ATERNA	GRAD O_DE_ INSTR.	ESTA DO_C IVIL	ZON A	ANE MIA_ DUR.	ITU_D URAN TE_EL	IMC	CON TRO_ L_PR	PSIC ROP ROFI.	PARI DAD	PER ODO_ INT.	ED# D_G EST.	INDUC CIO	PEF IOD_ O_E.	EPISI OTOM IA	PRE SENT ACIO.	PRES ENTA CION.	SEX O	PE SO_ AL.	PERI MET RO.	SEVE RIDA D_DE.
106	2	1	3	1	1	2	3	3	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2
107	2	2	2	1	1	1	3	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	3
108	2	1	2	2	2	1	4	3	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2
109	2	1	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	3
110	3	1	3	1	1	2	2	3	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2
111	2	1	2	2	3	2	3	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2
112	2	2	2	2	4	2	4	3	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2
113	2	1	3	1	1	1	3	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2
114	3	1	2	1	4	1	3	2	2	2	3	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2
115	2	1	3	1	1	2	3	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2
116	2	1	3	1	1	1	4	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2
117	3	1	2	1	2	1	3	3	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	3
118	3	1	3	1	1	2	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2
119	2	1	3	1	1	1	2	3	2	1	1	3	2	1	2	1	1	1	2	2	2
120	1	2	1	1	4	1	3	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2
121	3	1	2	2	1	3	3	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2
122	2	2	3	2	1	1	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	3
123	2	1	3	1	2	1	3	3	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	2
124	2	1	3	2	2	1	4	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	3
125	2	1	2	2	1	3	3	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2
126	2	2	2	1	1	2	3	3	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	3

Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicode:ACTIVADO

IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Visible: 21 de 21 variables

	EDAD_M	GRAD	ESTA	ZON	ANE	ITU_C	IMC	CON	PSIC	PARI	PER	ED#	INDUC	PEF	EPISI	PRE	PRES	SEX	PE	PERI	SEVE
	ATERNA	O_DE	DO_C	A	MIA	URAN		TRO	ROP	DAD	ODO	D_C	CIO	IOD	OTOM	SENT	ENTAC	O	SO	MET	RIDA
	INSTR.	IVIL		DUR.	TE_EL		L_PR	ROFI	INT.	EST.		O_E	O_E	IA	ACIO.	ACION	AL	AL	RO.	D_DE	
127	2	1	2	1	3	1	3	2	2	2	3	2	2	1	2	1	1	1	2	1	3
128	2	2	3	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2
129	2	1	2	1	1	3	3	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	3
130	2	1	2	1	1	3	2	3	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2
131	2	1	2	1	1	3	3	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2
132	2	1	2	1	2	1	3	3	1	2	3	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2
133	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2
134	1	2	2	2	1	1	3	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	3
135	2	1	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	3
136	2	1	2	1	1	2	2	3	2	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	3
137	2	1	3	1	3	2	3	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2
138	2	1	2	1	3	2	2	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	3
139	2	2	2	1	1	1	3	3	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2
140	2	2	3	1	4	2	3	3	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2
141	3	2	2	1	1	2	3	2	2	3	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2
142	3	2	3	2	1	2	3	3	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2
143	3	1	3	1	1	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2
144	2	1	2	1	1	1	3	3	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2
145	2	1	2	1	3	1	4	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2
146	3	1	3	1	1	1	2	3	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2
147	2	1	3	2	1	2	3	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	3

Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicoide ACTIVADO

IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Visible: 21 de 21 variables

	EDAD_M	GRAD	ESTA	ZON	ANE	ITU_C	IMC	CON	PSIC	PARI	PER	ED#	INDUC	PEF	EPISI	PRE	PRES	SEX	PE	PERI	SEVE
	ATERNA	O_DE	DO_C	A	MIA	URAN		TRO	ROP	DAD	ODO	D_C	CIO	IOD	OTOM	SENT	ENTAC	O	SO	MET	RIDA
	INSTR.	IVIL		DUR.	TE_EL		L_PR	ROFI	INT.	EST.		O_E	O_E	IA	ACIO.	ACION	AL	AL	RO.	D_DE	
148	2	2	2	1	1	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2
149	2	2	2	2	4	2	3	3	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2
150	3	1	3	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	2
151	2	1	2	2	3	1	3	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	3
152	2	1	3	1	1	1	3	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	3
153	2	2	2	2	1	3	3	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2
154	2	1	2	1	2	1	3	3	2	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	3
155	2	1	3	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2
156	2	1	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2
157	2	1	2	1	4	2	3	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	3
158	2	1	2	1	1	1	3	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2
159	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	3
160	3	2	2	1	1	1	3	3	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3
161	3	2	3	2	4	2	1	1	2	2	3	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
162	3	1	2	1	2	1	4	3	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2
163	2	1	2	1	1	1	3	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	3
164	2	1	3	1	1	1	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2
165	3	2	2	1	3	1	2	3	2	3	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1
166	2	1	2	1	1	1	2	3	2	2	3	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1
167	2	1	3	2	3	1	1	3	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1
168	2	1	2	1	2	1	2	3	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1

Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicoide ACTIVADO

IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Visible: 21 de 21 variables

	EDAD_M	GRAD	ESTA	ZON	ANE	ITU_C	IMC	CON	PSIC	PARI	PER	ED#	INDUC	PEF	EPISI	PRE	PRES	SEX	PE	PERI	SEVE
	ATERNA	O_DE	DO_C	A	MIA	URAN		TRO	ROP	DAD	ODO	D_C	CIO	IOD	OTOM	SENT	ENTAC	O	SO	MET	RIDA
	INSTR.	IVIL		DUR.	TE_EL		L_PR	ROFI	INT.	EST.		O_E	O_E	IA	ACIO.	ACION	AL	AL	RO.	D_DE	
169	2	1	2	1	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
170	2	1	2	1	2	2	2	3	2	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	1
171	2	1	2	1	1	1	2	3	2	3	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1
172	2	1	2	1	2	1	1	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1
173	2	1	2	2	1	1	2	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
174	2	1	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
175	2	1	3	1	1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1
176	2	1	2	2	3	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
177	2	1	3	1	3	2	2	2	2	3	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1
178	2	1	2	1	1	1	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1
179	3	1	3	1	1	1	2	3	2	3	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1
180	3	1	3	1	1	1	3	3	2	3	3	3	2	1	1	2	1	2	1	2	1
181	2	1	2	1	1	2	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	2	1
182	2	1	3	1	3	2	3	3	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
183	2	1	2	2	1	1	2	3	2	2	3	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1
184	2	2	2	1	1	1	2	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
185	2	2	3	1	1	3	3	2	2	3	3	3	2	1	1	2	1	2	3	2	1
186	2	1	2	1	1	1	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
187	2	2	2	1	1	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1
188	2	1	2	1	3	1	3	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1
189	2	1	2	1	1	1	2	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1

Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Visible: 21 de 21 variables

	EDAD_M	GRAD	ESTA	ZON	ANE	ITU_C	IMC	CON	PSIC	PARI	PER	ED	INDUC	PEF	EPISI	PRE	PRES	SEX	PE	PERI	SEVE	
	ATERNA	O DE	DO_C	A	MIA	URAN	URAN	TRO	ROP	DAD	ODO	D_G	CIO	IOD	OTOM	SENT	ENT	O	SO	MET	RIDA	
		INSTR.	IVIL		DUR.	TE_EL	L_PR	L_PR	ROFI		INT.	EST.		O_E	IA	ACIO.	CION.		AL.	RO.	D_DE.	
190	2	1	2	1	1	2	1	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1
191	2	1	3	1	1	1	1	3	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1
192	2	2	3	1	3	1	2	2	2	2	1	3	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1
193	3	2	2	2	1	1	1	3	2	3	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1
194	2	2	2	1	1	1	3	3	2	1	1	3	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1
195	2	1	3	1	1	2	2	3	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1
196	2	1	3	1	1	2	2	3	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1
197	2	1	3	1	2	1	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1
198	2	1	2	1	1	1	3	3	2	3	3	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1
199	3	1	2	1	2	2	1	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1
200	3	1	3	1	1	3	1	2	2	2	3	3	2	1	2	2	1	1	1	2	2	1
201	2	1	2	2	2	1	3	3	2	2	3	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	1
202	2	1	2	1	1	1	2	3	2	3	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1
203	3	1	2	1	3	1	1	2	2	3	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1
204	2	1	3	1	1	2	3	3	2	3	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1
205	2	1	2	1	3	3	1	2	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1
206	3	1	3	1	1	1	2	3	2	2	3	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1
207	2	1	2	1	2	1	3	3	2	2	3	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1
208	2	1	2	1	1	1	2	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1
209	2	2	2	1	1	1	3	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1
210	2	2	2	1	1	2	3	3	2	3	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1

Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicode:ACTIVADO

IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Visible: 21 de 21 variables

	EDAD_M	GRAD	ESTA	ZON	ANE	ITU_C	IMC	CON	PSIC	PARI	PER	ED	INDUC	PEF	EPISI	PRE	PRES	SEX	PE	PERI	SEVE	
	ATERNA	O DE	DO_C	A	MIA	URAN	URAN	TRO	ROP	DAD	ODO	D_G	CIO	IOD	OTOM	SENT	ENT	O	SO	MET	RIDA	
		INSTR.	IVIL		DUR.	TE_EL	L_PR	L_PR	ROFI		INT.	EST.		O_E	IA	ACIO.	CION.		AL.	RO.	D_DE.	
211	2	1	3	1	3	2	3	3	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1
212	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1
213	2	1	2	1	3	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1
214	2	1	2	1	1	3	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1
215	2	1	2	1	1	2	3	3	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1
216	2	1	2	1	1	2	3	3	2	2	3	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
217	2	1	2	1	2	1	3	3	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1
218	2	1	2	1	1	1	1	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1
219	2	1	2	1	1	1	3	2	2	1	1	3	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1
220	2	1	3	1	1	1	2	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1
221	2	1	2	1	1	1	3	3	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1
222	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1
223	2	2	2	1	1	3	3	3	2	3	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1
224	2	1	2	2	1	2	3	3	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1
225	3	2	2	1	1	1	1	3	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1
226	2	1	2	2	1	1	2	3	2	2	3	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1
227	2	1	2	1	1	1	2	3	2	2	3	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1
228	2	1	2	1	1	2	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1
229	2	1	3	1	3	1	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1
230	2	1	2	1	1	2	3	3	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1
231	2	1	3	1	1	1	2	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1

Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicode:ACTIVADO

IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Visible: 21 de 21 variables

	EDAD_M	GRAD	ESTA	ZON	ANE	ITU_C	IMC	CON	PSIC	PARI	PER	ED	INDUC	PEF	EPISI	PRE	PRES	SEX	PE	PERI	SEVE	
	ATERNA	O DE	DO_C	A	MIA	URAN	URAN	TRO	ROP	DAD	ODO	D_G	CIO	IOD	OTOM	SENT	ENT	O	SO	MET	RIDA	
		INSTR.	IVIL		DUR.	TE_EL	L_PR	L_PR	ROFI		INT.	EST.		O_E	IA	ACIO.	CION.		AL.	RO.	D_DE.	
232	2	1	2	1	3	1	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1
233	2	1	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1
234	2	1	2	1	1	1	3	3	2	1	1	3	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1
235	3	2	3	1	1	1	2	3	2	2	3	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1
236	2	1	2	1	2	2	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1
237	2	1	2	1	1	1	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1
238	2	1	2	1	1	3	1	3	2	3	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1
239	3	1	2	1	1	1	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1
240	3	1	2	1	3	1	3	2	2	1	1	3	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1
241	2	2	3	1	1	2	3	3	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1
242	2	1	2	1	1	1	2	3	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1
243	2	2	2	1	2	1	2	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1
244	2	1	2	1	3	1	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1
245	2	1	2	1	1	1	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1
246	3	1	2	1	1	1	2	3	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1
247	2	1	2	1	1	1	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1
248	2	1	2	1	2	1	2	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1
249	2	1	2	2	1	1	1	3	2	2	3	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1
250	3	1	2	1	1	2	3	3	2	2	3	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1
251	2	1	2	1	1	1	3	2	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1
252	2	2	2	1	1	2	2	3	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1

Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicode:ACTIVADO

IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Visible: 21 de 21 variables

	EDAD_M ATERNA	GRAD O_DE_ INSTR.	ESTA DO_C IVIL	ZON A	ANE MIA_ DUR.	ITU_C URAN TE_EL	IMC	CON TRO_ L_PR	PSIC ROP ROFI	PARI DAD	PER ODO_ INT.	ED/ D_G EST.	INDUC CIO	PEF IOD O_E	EPISI OTOM IA	PRE SENT ACIO.	PRES ENTA CION.	SEX O	PE SO_ AL.	PERI MET RO_	SEVE RIDA D_DE.
253	2	2	2	2	2	1	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
254	2	1	2	1	1	1	2	3	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1
255	2	2	2	1	1	2	3	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	1
256	2	1	2	1	1	3	3	3	2	1	1	3	2	1	1	2	1	1	2	1	1
257	3	1	3	1	1	3	2	3	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1
258	2	2	2	2	1	3	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1
259	2	1	2	1	1	1	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1
260	2	2	2	1	1	1	3	3	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1
261	2	1	2	1	2	1	3	2	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
262	3	2	2	1	1	2	1	3	2	3	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1
263	2	2	2	1	1	1	2	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1
264	1	3	1	1	1	1	3	3	2	1	1	3	2	1	1	1	1	2	1	1	1
265	3	1	3	1	1	2	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1
266	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	3	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
267	3	2	3	1	1	3	2	3	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1
268	2	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
269	2	1	2	1	1	1	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
270	2	1	2	2	1	3	1	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1
271	2	1	3	1	1	1	3	3	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1
272	2	1	2	2	1	2	2	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1
273	2	1	2	2	3	1	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1

Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicode ACTIVADO

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Visible: 21 de 21 variables

	EDAD_M ATERNA	GRAD O_DE_ INSTR.	ESTA DO_C IVIL	ZON A	ANE MIA_ DUR.	ITU_C URAN TE_EL	IMC	CON TRO_ L_PR	PSIC ROP ROFI	PARI DAD	PER ODO_ INT.	ED/ D_G EST.	INDUC CIO	PEF IOD O_E	EPISI OTOM IA	PRE SENT ACIO.	PRES ENTA CION.	SEX O	PE SO_ AL.	PERI MET RO_	SEVE RIDA D_DE.
295	2	1	2	1	1	3	2	3	2	1	3	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1
296	3	1	3	2	2	3	4	2	2	3	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1
297	2	1	2	2	1	1	3	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1
298	2	1	2	1	2	1	3	3	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1
299	2	2	3	2	3	1	3	3	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1
300	1	2	2	2	3	1	3	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1
301	2	1	2	1	1	4	3	2	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
302	2	1	3	2	1	2	4	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
303	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1
304	2	2	3	1	2	1	3	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1
305	3	1	3	1	1	1	1	3	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1
306	2	2	2	2	3	2	4	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1
307	2	1	3	1	1	1	2	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1
308	2	1	2	2	3	3	2	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
309	3	1	2	2	2	2	3	3	2	1	3	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
310	3	2	3	2	1	1	3	3	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
311	2	1	2	2	1	1	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1
312	3	1	2	1	1	2	3	3	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1
313	2	2	2	2	3	1	4	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1
314	2	2	2	1	2	3	4	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1
315	2	2	3	2	2	3	1	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1

Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicode ACTIVADO

IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Visible: 21 de 21 variables

	EDAD_M ATERNA	GRAD O_DE INSTR.	ESTA DO_C IVIL	ZON A	ANE MIA DUR.	ITU_D URAN TE_EL	IMC	CON TRO L_PR	PSIC ROP ROFI	PARI DAD	PER ODO INT.	ED# D_G EST.	INDUC CIO	PEF IOD O_E	EPISI OTOM IA	PRE SENT ACIO.	PRES ENTA CION.	SEX O	PE SO AL.	PERI MET RO.	SEVE RIDA D_DE.
274	2	2	3	1	1	1	3	3	2	2	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1
275	2	1	3	2	1	3	4	3	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	1
276	1	2	3	1	3	2	3	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
277	2	1	2	2	1	2	3	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1
278	2	1	2	1	2	1	3	3	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1
279	3	2	3	2	1	1	3	3	2	2	3	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1
280	3	2	2	2	2	1	4	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
281	2	1	3	1	1	3	1	3	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1
282	2	1	3	2	3	1	3	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1
283	2	2	2	1	1	2	3	3	2	1	3	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1
284	2	2	2	1	1	2	2	3	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1
285	2	1	2	1	1	2	3	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1
286	2	1	3	2	1	1	1	3	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1
287	3	2	2	2	2	1	4	2	2	2	3	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1
288	3	1	3	1	2	1	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1
289	2	1	2	2	2	2	3	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
290	2	1	3	2	3	1	3	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
291	2	1	2	1	1	1	3	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
292	2	2	3	2	1	3	1	3	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1
293	2	2	3	1	1	1	2	3	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1
294	2	1	2	2	3	1	3	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1

Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicode:ACTIVADO

IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Visible: 21 de 21 variables

	EDAD_M ATERNA	GRAD O_DE INSTR.	ESTA DO_C IVIL	ZON A	ANE MIA DUR.	ITU_D URAN TE_EL	IMC	CON TRO L_PR	PSIC ROP ROFI	PARI DAD	PER ODO INT.	ED# D_G EST.	INDUC CIO	PEF IOD O_E	EPISI OTOM IA	PRE SENT ACIO.	PRES ENTA CION.	SEX O	PE SO AL.	PERI MET RO.	SEVE RIDA D_DE.
316	2	2	3	2	1	1	3	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1
317	2	1	3	2	3	1	1	3	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1
318	3	1	2	1	1	2	2	3	2	2	3	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1
319	3	1	3	2	1	3	3	3	2	1	3	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
320	2	2	2	2	1	2	3	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1
321	2	1	2	1	1	1	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
322	2	2	3	1	3	3	4	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
323	2	1	2	2	1	1	3	3	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1
324	2	2	2	2	1	2	1	3	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1
325	2	1	2	1	2	1	2	3	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1
326	2	1	3	2	1	1	3	3	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1
327	2	1	3	1	3	2	3	3	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1
328	2	1	3	2	3	1	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1
329	2	1	3	1	2	2	4	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1
330	2	2	2	1	2	1	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1
331	2	1	3	1	1	3	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
332	2	2	2	2	1	2	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1
333	2	1	2	2	1	2	3	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1
334	2	2	2	1	1	1	1	3	2	1	2	3	2	1	1	1	1	2	2	2	1
335	2	1	3	2	3	2	3	3	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1
336	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1

Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicode:ACTIVADO

IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Visible: 21 de 21 variables

	EDAD_M ATERNA	GRAD O_DE INSTR.	ESTA DO_C IVIL	ZON A	ANE MIA DUR.	ITU_D URAN TE_EL	IMC	CON TRO L_PR	PSIC ROP ROFI	PARI DAD	PER ODO INT.	ED# D_G EST.	INDUC CIO	PEF IOD O_E	EPISI OTOM IA	PRE SENT ACIO.	PRES ENTA CION.	SEX O	PE SO AL.	PERI MET RO.	SEVE RIDA D_DE.
337	3	1	2	1	1	1	2	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1
338	2	1	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	1
339	2	1	3	1	3	3	4	3	2	1	3	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1
340	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1
341	2	2	2	2	2	1	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1
342	2	2	3	1	3	2	3	3	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
343	3	1	3	2	1	1	3	3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1
344	2	1	2	1	2	1	3	3	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	1
345	2	1	2	2	3	1	2	3	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
346	2	2	2	2	1	1	3	3	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1
347	2	1	3	2	2	2	1	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
348	2	2	2	2	3	2	4	3	2	1	3	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
349	2	1	2	1	3	1	3	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1
350	3	1	3	1	3	1	3	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
351	3	2	3	2	3	1	3	3	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1
352	2	1	2	2	1	1	2	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
353	2	2	3	1	2	2	1	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1
354																					
355																					
356																					
357																					

Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicode:ACTIVADO

ANEXO 5: DOCUMENTO DE AUTORIZACION

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

Chincha Alta, 27 de Noviembre del 2024

OFICIO N°1313-2024-UAI-FCS
Dr. Berling Torres Ali
Director
HOSPITAL III ESSALUD "LA CAPILLA" JULIACA
Presente. -

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Ica tiene como principal objetivo formar profesionales con un perfil científico y humanístico, sensibles con los problemas de la sociedad y con vocación de servicio, este compromiso lo interiorizamos a través de nuestros programas académicos, bajo la excelencia en la formación académica, y trabajando transversalmente con nuestros pilares como son la **investigación**, responsabilidad social y bienestar universitario en inserción laboral.

En tal sentido, nuestra estudiante se encuentra en el desarrollo de su Tesis, que le permitirá obtener el Título Profesional anhelado, de acuerdo con las líneas de investigación de nuestra Facultad, para los programas académicos de Enfermería, Psicología y Obstetricia. Las estudiantes han tenido a bien seleccionar temas de estudio de interés con la realidad local y regional, tomando en cuenta a la institución que usted dirige.

Como parte de la exigencia del proceso de investigación, se debe contar con la **autorización** de la Institución elegida, para que las estudiantes puedan proceder a realizar el estudio, recabar información y aplicar su instrumento de investigación, misma que a través del presente documento solicitamos.

Adjuntamos la carta de presentación de las estudiantes con el tema de investigación propuesto y quedamos a la espera de su aprobación.

Sin otro particular y con la seguridad de merecer su atención, me suscribo, no sin antes reiterarle los sentimientos de mi especial consideración.

Mag. Jose Yomil Perez Gomez
DECANO (E)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA

EsSalud

Expediente N° 0080920250000296
Remite a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA SAC - IUT
Destinatario: C/Copia N° de Folios
DHIIJ: 2
Recibido: 03/02/2025 - 12:11 N° Anexo
Referencia: Registrador
ZELA GUARIS DARYS GIBEL

Ofic: OFICIO
N: 1313 2024 UAI-FCS
Observación:

Consultar: www.essalud.gob.pe
Línea: (011) 265 6000 / (011) 265 / 200
Nota: La impresión del documento es el contenido.

☎ (056) 269176
✉ info@autonoma-de-ica.edu.pe
📍 Av. Abelardo Alva Maurtua 489
🌐 autonoma-de-ica.edu.pe

CARTA DE PRESENTACIÓN

El Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Ica, que suscribe

Hace Constar:

Que, **CORNEJO GADEA, Laura Fiorella** identificada con código N°0077200855 y **MAMANI GONZALES, Dayerli Kaori** identificada con código N°0074228886, ambas del Programa Académico de Obstetricia, quienes vienen desarrollando la tesis denominada: **"FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL DESGARRO PERINEAL EN PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO – OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III – ESSALUD, JULIACA - 2024"**.

Se expide el presente documento, a fin de que el encargado, tenga a bien autorizar a las estudiantes en mención, a recoger los datos y aplicar su instrumento para su investigación, comprometiéndose a actuar con respeto y transparencia dentro de ella, así como a entregar una copia de la investigación cuando esté finalmente sustentada y aprobada, para los fines que se estimen necesarios.

Chincha Alta, 27 de Noviembre del 2024

Mag. Jose Yomil Perez Gomez
DECANO (E)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA

(056) 269176
info@autonomaica.edu.pe
Av Abelardo Alva Maurtua 489
autonomaica.edu.pe

“AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

CONSTANCIA DE APLICACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

El que suscribe, Jefe del departamento Materno Infantil del Hospital III, Essalud Red Asistencial - Juliaca.

Otorga la presente constancia de aplicación del instrumento de recolección de datos (guía de análisis documentado) del proyecto de investigación a:

Bachilleres: CORNEJO GADEA LAURA FIORELLA identificada con DNI N° 77200855 y MAMANI GONZÁLES DAYERLI KAORI identificada con DNI N° 74228886 del programa académico de Obstetricia.

Quienes han realizado la aplicación del instrumento de recolección de datos (guía de análisis documentado) del proyecto de investigación (Tesis) **“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL DESGARRO PERINEAL EN PUERPERAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO - OBSTETRICIA DEL HOSPITAL III - ESSALUD, JULIACA 2024”**, bajo mi autorización y supervisión.

Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas para los fines que estime conveniente.

Dr. JUAN PABLO CONDORI QUISPE
JEFE DEPARTAMENTO MATERNO INFANTIL
HOSPITAL III RED ASISTENCIAL-JULIACA
CMP 31845 RNE 20937

Juliaca, 29 de noviembre 2024

Anexo 6: Evidencia fotográfica

Obst, Serafina Alicia Pariguana Galicia, recepcionandonos en el servicio de Gineco Obstetricia del Hospital III – Essalud, Juliaca

Libro de registros de partos en el cual se encuentra la mayoría de datos necesarios.

RECOLECTANDO DATOS

Anexo 7: Informe de Turnitin al 13% de similitud

CORNEJO GADEA Y MAMANI GONZALES.docx

2025

2025

Universidad Autónoma de Ica

Detalles del documento

Identificador de la entrega
trn:oid::3117442617496

Fecha de entrega
25 mar 2025, 6:39 p.m. GMT-5

Fecha de descarga
25 mar 2025, 6:49 p.m. GMT-5

Nombre de archivo
CORNEJO GADEA Y MAMANI GONZALES.docx

Tamaño de archivo
12.5 MB

127 Páginas

22.177 Palabras

117.696 Caracteres

13% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Small Matches (less than 15 words)

Top Sources

- 11% Internet sources
- 0% Publications
- 7% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

1 Integrity Flag for Review

- **Hidden Text**
8 suspect characters on 1 page
Text is altered to blend into the white background of the document.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 11% Internet sources
- 0% Publications
- 7% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	fetalmedicinebarcelona.org	2%
2	Internet	repositorio.upsjb.edu.pe	1%
3	Internet	www.ti.autonoma deica.edu.pe	1%
4	Internet	hdl.handle.net	1%
5	Internet	repositorio.autonoma deica.edu.pe	1%
6	Internet	repositorio.continental.edu.pe	<1%
7	Submitted works	Universidad Nacional del Centro del Peru on 2024-12-17	<1%
8	Internet	repositorio.unica.edu.pe	<1%
9	Internet	1library.co	<1%
10	Internet	cybertesis.unmsm.edu.pe	<1%
11	Submitted works	Universidad Ricardo Palma on 2018-12-18	<1%

12	Submitted works	Universidad Señor de Sipan on 2024-12-15	<1%
13	Submitted works	Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez on 2022-11-15	<1%
14	Submitted works	Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez on 2024-02-06	<1%
15	Submitted works	Universidad de San Martín de Porres on 2023-11-15	<1%
16	Internet	medisur.sld.cu	<1%
17	Submitted works	Universidad Continental on 2023-04-14	<1%
18	Submitted works	Universidad Autónoma de Ica on 2023-09-18	<1%
19	Submitted works	Universidad Autónoma de Ica on 2018-01-29	<1%
20	Submitted works	uncedu on 2025-01-31	<1%
21	Submitted works	Universidad Tecnológica de los Andes on 2023-09-13	<1%
22	Internet	repositorio.uap.edu.pe	<1%
23	Submitted works	Universidad Andina del Cusco on 2019-03-07	<1%
24	Submitted works	uncedu on 2024-10-18	<1%
25	Internet	repositorio.uancv.edu.pe	<1%

26	Submitted works	Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez on 2023-01-23	<1%
27	Submitted works	Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez on 2022-08-25	<1%
28	Submitted works	Universidad Autónoma de Ica on 2017-08-30	<1%
29	Submitted works	Universidad Mariano Gálvez de Guatemala on 2024-09-28	<1%
30	Internet	repositorio.undac.edu.pe	<1%
31	Internet	repositorio.uwiener.edu.pe	<1%
32	Submitted works	uncedu on 2025-02-04	<1%
33	Submitted works	Universidad Peruana Union on 2023-12-11	<1%
34	Internet	repositorio.unsaac.edu.pe	<1%
35	Internet	www.repositorio.autonomadeica.edu.pe	<1%
36	Submitted works	Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez on 2024-11-28	<1%
37	Submitted works	uncedu on 2025-02-05	<1%
38	Submitted works	Universidad Autónoma de Ica on 2023-01-11	<1%
39	Submitted works	Universidad Católica De Cuenca on 2017-09-08	<1%

40	Internet	
repositorio.unasam.edu.pe		<1%
<hr/>		
41	Internet	
repositorio.upao.edu.pe		<1%